



# التفاعل بين الكائنات الدقيقة

المعلم الثامن


الجوهره العباد – نوره الكبيسي

2016



ثبيت النيتروجين

Nitrogen Fixation



## ❖ عنصر النيتروجين N<sub>2</sub>

• أحد العناصر الغذائية الهامة لحياة الكائنات الحية، فهو يدخل ضمن المكونات الأساسية لبرتوبلازم الخلايا (تركيب البروتينات و الإنزيمات و الأحماض النووية)، لذلك فهو مهم لخصوبة التربة و الإنتاج الزراعي، و أي نقص في هذا العنصر يؤدي إلى ضعف و نقص المحصول الزراعي.



- يكُون النيتروجين 79% من حجم الهواء الجوي، في حين لا تحتوي الصخور و التربة على هذا العنصر.
- على الرغم من وفرته في الجو إلا أن الكائنات الحية – خصوصاً النبات – لا يستطيع الإستفادة منه بصورته الغازية  $N_2$ ، وهي صورة خاملة لا يستفيد منها النبات. لذلك لابد من تحويله إلى صورة معدنية قابلة للإمتصاص من قبل النبات.



- 
- يسهل فقد النيتروجين من التربة، و ذلك إما عن طريق :
    - ▶ التطاير.
    - ▶ التغسيل بالماء أثناء الري.
    - ▶ استهلاك المحاصيل الزراعية.
  - لكن يُعوض هذا النقص بإضافة النيتروجين في صورة عضوية أو معدنية.

• تعرف العملية التي يتم فيها تحويل النيتروجين الخاملي في صورته الغازية  $N_2$  إلى نيتروجين صالح للاستخدام من قبل الكائنات الحية باسم عملية تثبيت النيتروجين الجوي

.Nitrogen Fixation





ثبيت النيتروجين الجوي

Nitrogen Fixation

## ❖ تعريفها

• هي عملية يتم فيها تحويل غاز النيتروجين الجوي من صورته الخامدة، إلى مركبات نيتروجينية قابلة للاستخدام من قبل الكائنات الحية كالنترات، والأمونيا و النشادر.







## أولاًً : الطرق الغير حيوية

### الطرق الصناعية

يحدث عن طريق تفاعل يعرف بإسم - Haber Bosch reaction حيث يتفاعل النيتروجين الجوي  $N_2$ ، مع الهيدروجين  $H_2$ ، في وجود عامل محفز (أوكسيد الحديد)، تحت ضغط و درجة حرارة مرتفعة ( $500^{\circ}M$ ) و ينتج عن ذلك الأمونيا. يعتبر هذا التفاعل أساس إنتاج الأسمدة النيتروجينية

### الطرق الطبيعية

قد تحدث نتيجة :

1. حدوث الشرارة الكهربائية أثناء عملية البرق مما يؤدي إلى أكسدة غاز النيتروجين، وتصل هذه الأكاسيد إلى الأرض مع المطر.
2. تساعد الأشعة فوق البنفسجية على اتحاد النيتروجين مع الهيدروجين الموجود في الجو و ينتج عن ذلك تكون الأمونيا.


- كمية النيتروجين الجوى المثبتة كيميائياً (طبيعاً وصناعياً) قليلة جداً بالمقارنة بالكمية المثبتة بيولوجياً.



## ❖ ثانياً: الطرق الحيوية

- يطلق عليها اسم **(الثنيت الحيوي)**، و هو تحويل النيتروجين الغازي في الغلاف الجوي إلى نيتروجين عضوي يدخل في تركيب المركبات النيتروجينية العضوية.

- تلخص هذه العملية بقدرة أنواع مختلفة من الكائنات الدقيقة المتخصصة على احتزال النيتروجين الجوي و تحويله إلى  $\text{NH}_3$  تحت الظروف العادية من الضغط ودرجة الحرارة، و بالتالي يتحول إلى مركب عضوي.
- لذلك نجد أن الكائنات الدقيقة تقوم بدور هام في تحديد طبيعة دورة النيتروجين في الأرض، حيث تتحكم في تحويل جزيئات النيتروجين الجوي إلى نيتروجين عضوي. تعتبر هذه الطريقة أهم الطرق في زيادة محتوى الأرض من النيتروجين.





## 1. التثبيت اللاتكافلي Non symbiotic N- Fixation

• تقوم به كائنات حرة المعيشة في التربة الزراعية Free-living organisms وجد النبات أو لم يوجد، وإن كان بعضها ينشط أكثر في وجود النبات وإن لم يكن يعتمد عليه، وبالتالي يكون هذا التثبيت غير تكافليًّا.



- يتم فيه تحويل النيتروجين الغازي بواسطة هذه الكائنات إلى نيتروجين عضوي داخل أجسامها، و بعد موت هذه الكائنات و تحلل أجسامها يتحول إلى نيتروجين ميسر للنبات نتيجة لعملية المعدنة.


## معدنة النيتروجين العضوي Nitrogen mineralization

هي العملية التي يحدث بها تحلل لجزء من محتوى النيتروجين العضوي في الأراضي، حيث يكون ناتج التحلل هو الأمونيا .Ammonification




## الثبتت الحيوي الغير تكافلي

الوصف	الطريقة
بكتيريا لا هوائية، لها القدرة على ثبيت النيتروجين في الأراضي الحامضية ذات pH أقل من 6.	<b><i>Clostridium</i> sp.</b>
من أجناس <i>Gloecapsa</i> ، <i>Anabaena</i> ، <i>Nostoc</i> ، توجد تحت ظروف بيئية واسعة المدى . لديها حويصلات معايرة تحتوي على إنزيم النيتروجين الذي له دور هام في عملية الثبيت.	<b><i>Cyanobacteria</i></b>
بكتيريا هوائية، وتنشر هذه البكتيريا في جميع أنواع الأراضي ماعدا الحامضية ذات pH أقل من 6.	<b><i>Azotobacter</i> sp.</b>
■ من الجدير بالذكر أن كمية النيتروجين المثبتة بواسطة البكتيريا الحرة أقل من تلك التي تثبت بواسطة البكتيريا التكافلية.	





# Azotobacter

## ❖ خصائصها



- بكتيريا هوائية إجباراً.
- سالبة لصبغة جرام.
- شبه كروية أو بيضاوية.
- توجد مفردة أو في أزواج.
- كبيرة الحجم طولها 5 – 7 ميكرومتر، و عرضها 3 – 4 ميكرومتر.
- درجة الحرارة المناسبة لنموها 30 – 35 م°.

- محاطة بغلاف هلامي سميك (capsule)، وجوده يجعل من الصعب الحصول عليها بصورة نقية.
- تعيش في بيئة خالية من النيتروجين وتحتاج في البيئة إلى مصادر كربونية حتى تنمو بصورة جيدة فيها مثل : السكروز .
- تحتاج لعنصر K – Ca – P .
- تحتاج إلى رطوبة وتهوية ورقم pH مناسب (6 - 8)
- تتناسب كمية النيتروجين المثبتة مع كمية نمو الميكروب.





• الأزوتوباكتر ليس لها القدرة على تحلل السليلوز و المواد العضوية المعقدة، لذلك فهو يعيش معيشة تعاونية مع ميكروبات التربة الأخرى التي تحلل هذه المواد لتنتج السكريات والأحماض العضوية و غيرها التي تستعملها الأزوتوباكتر كمصدر للطاقة. في المقابل تستطيع أن تثبت النيتروجين الجوي في التربة لاستفادة منها ميكروبات التربة الغير مثبتة للنيتروجين.

- تحلل الأزوٰتوباكتر المانيتول و تستخدمه كمصدر كربوهيدراتي، كما تفرز أثناء نموها مواد نيتروجينيه تساعد على نمو أنواع أخرى من الميكروبات الزراعيه مما يساهم في خصوبة التربة.






تمدّها الطحالب بما تحتاجه من المواد الكربوهيدراتية، في حين تعمل الأزوتوباكتر على تزويد الطحالب بالمواد النيتروجينية.

## Cyanobacteria

تقوم الأزوتوباكتر بسحب الأوكسجين من الوسط المحيط فتستطيع *Clostridium* أن تنمو، وفي المقابل يستفيد الأزوتوباكتر من الأحماض العضوية التي تنتج عن *Clostridium* كمصدر للطاقة.

## *Clostridium* sp.

جامعة الملك سعود  
كلية الزراعة  
قسم البكتيرiology



التطبيق العملي



## ❖ البيئة المستخدمة

• بيئة 77، و هي بيئة خالية من Waksman base medium no. مركبات النيتروجين، و تحتوي على المانitol بدلاً من الجلوكوز كمصدر للكربوهيدرات، لأن الجلوكوز يحفز نمو البكتيريا اللاهوائية.

## ❖ الأدوات



• بيئة Waksman base medium no. 77

- طروف التعقيم.
- عينات تربة زراعية خصبة.
- ماصات معقمة سعة 1 مل.
- دوارق سعة 50 مل.
- قطارات.



يعبأ 25 مل من البيئة في دوارق ثم تعقم


يحضر محلول التربة الزراعية بالإضافة 1مل إلى 25  
مل ماء معقم، حيث يرج جيداً ثم يترك ليترسب.

نلقي البيئة بـ 1 مل من محلول التربة.

تحضن الدوارق لمدة أسبوع عند درجة حرارة 25°C،  
حيث يتم ملاحظة النمو على السطح بعد 3 أيام تقريباً.

يحضر منها غشاء بكتيري ويصبح بصبغة جرام و  
تفحص الشريحة بالعدسة الزيتية.

- يظهر النمو على هيئة غشاء هلامي على سطح البيئة، لذلك يراعى استخدام القطاره عند فحص العينة من هذا الغشاء.





نهاية المعمل..

alalabba@ksu.edu.sa

nalkubaisi@ksu.edu.sa