


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٢٠١٣



قسم الكيمياء الحيوية
Biochemistry Department

College of Science - King Saud University

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة الملك سعود
كلية العلوم
قسم الكيمياء الحيوية

مذكرة عملي

١٠١ كيج

محتويات الكتاب

1	١. السلامة في المختبرات
1	قواعد ومواصفات السلامة في المختبرات
1	احتياطات السلامة من مخاطر الكيماويات
2	العلامات الإرشادية للمواد الكيميائية
2	احتياطات السلامة من مخاطر الزجاجيات
3	احتياطات السلامة من المخاطر الكهربائية
3	إرشادات السلامة في مختبرات قسم الكيمياء الحيوية
4	٢. المحاليل المنظمة
4	الرقم الهيدروجيني pH
4	قياس الرقم الهيدروجيني
4	المحاليل المنظمة
5	سعة المحلول المنظم
6	تحضير محلول منظم فوسفاتي
7	دراسة خواص المحاليل
9	٣. الأحماض الأمينية
9	3.1. الخواص الكيميائية و الفيزيائية للأحماض الأمينية
9	3.1.1. النشاط الضوئي
10	3.1.2. الخاصية الأمفوتيرية ونقطة التعادل الكهربائي
10	3.1.3. درجة الإنصهار
11	3.2. الاختبارات العامة و الوصفية للأحماض الأمينية
11	3.2.1. اختبار الذوبانية
13	3.2.2. اختبار التنهيدرين
15	3.2.3. الكشف عن الأحماض الأمينية المحتوية على الكبريت
17	3.2.4. اختبار مليون
20	3.2.5. اختبار الزانثوبروتينيك
22	3.2.6. اختبار سكافاجوتشي

25	٤. البروتينات
25	٤.١. الأشكال البنائية للبروتين
26	٤.٢. نقطة التعادل الكهربائي للبروتين
27	٤.٣. الاختبارات الوصفية للبروتينات
27	٤.٣.١. ذوبان البروتينات
29	٤.٣.٢. اختبار البيوريت
31	٤.٣.٣. أثر الأملاح على ذوبانية البروتين
33	٤.٣.٤. ترسيب البروتينات بأملاح المعادن الثقيلة
34	٤.٣.٥. الترسيب بالأحماض القوية
36	٤.٤. التقدير الكمي للبروتينات
36	٤.٤.١. طريقة لاوري
40	٥. الإنزيمات
40	٥.١. العوامل المؤثرة في نشاط الإنزيمات
40	٥.٢. مبدأ دراسة نشاط الإنزيمات بطريقة عملية
41	٥.٣. الاختبارات الوصفية للكشف عن نشاط بعض الإنزيمات
41	٥.٣.١. إنزيم الأميليز
41	٥.٣.١.١. اختبار نشاط إنزيم الأميليز
44	٥.٣.١.٢. اختبار الطبيعة الكيميائية لإنزيم الأamiliz
46	٥.٣.١.٣. اختبار خصوصية مادة التفاعل لإنزيم الأamiliz
47	٥.٣.١.٤. اختبار تأثير درجة الحرارة على نشاط إنزيم الأamiliz
48	٥.٣.٢. إنزيم السكريز
50	٥.٣.٣. إنزيم بولي فينول أكسيديز
52	٥.٣.٣.١. اختبار النشاط الإنزيمي للبولي فينول أكسيديز
53	٥.٣.٣.٢. اختبار الطبيعة الكيميائية لإنزيم بولي فينول أكسيديز
55	٥.٣.٣.٣. اختبار خصوصية مادة التفاعل لإنزيم بولي فينول أكسيديز
56	٥.٣.٣.٤. اختبار تأثير درجة الحرارة على النشاط إنزيم بولي فينول أكسيديز
57	٥.٣.٤. الكشف عن الطبيعة الكيميائية للإنزيمات

58	6. الكربوهيدرات (١)
58	6.1. مقدمة
58	6.2. وظيفة الكربوهيدرات
58	6.3. تصنيف الكربوهيدرات
59	6.4. الاختبارات العامة للكربوهيدرات
59	6.4.1. اختبار الذوبانية
61	6.4.2. اختبار موليش
64	6.4.3. الاختبارات احتزالية
64	6.4.3.1. اختبار بندكت
66	6.4.3.2. اختبار بارفويد
68	6.4.3.3. اختبار بايل
70	6.4.3.4. اختبار سلفانوف
72	7. الكربوهيدرات (٢)
72	7.1. التركيب الحلقي للسكريات الأحادية
72	7.2. الكربوهيدرات عديدة التسکر
73	7.3. الإختبارات العملية للسكريات العديدة والثنائية
73	7.3.1. كشف اليود
75	7.3.2. التحلل المائي للسكروروز
77	7.3.3. التحلل المائي للنشا
79	8. الدهون
79	8.1. الأحماض الدهنية
80	8.2. الاختبارات الوصفية للدهون
80	8.2.1. اختبار الذوبانية
83	8.2.2. اختبار الاكرولين
85	8.2.3. اختبار التصبن
87	8.2.4. اختبار فصل الصابون من محلول بالتمليس
88	8.2.5. اختبار تحضير الأحماض الدهنية من الصابون
89	8.2.6. اختبار تكوين أملاح الأحماض الدهنية الغير ذاتية
91	8.2.7. اختبار خلات النحاس
93	8.2.8. اختبار عدم التشبع (اختبار اليود)
92	9. تقدير سكر الجلوكوز في الدم

٩٥

٦. تقدير فيتامين ج (حمض الأسكوبيك) في العصير

٩٨

١١ المراجع

١- السلامة في المختبرات

إن العمل في المختبرات يتطلب وعي كامل بأهمية وخطورة المواد والأجهزة المستخدمة، حيث أن كثير من المواد يتصرف بالسمية أو مهيج للأغشية ومن المواد ما هو حارق أو يشتعل وغير ذلك من أشكال الخطورة، لذا يجب قبل البدء في العمل المخبري أن نعي أهمية وخطورة المواد المستخدمة. وأخذ الحيطة والحذر وإتباع تعليمات السلامة الموصى بها بكل مختبر.

١.١. قواعد ومواصفات السلامة في المختبرات:

- ١- يجب أن تكون مساحة المختبر تتناسب مع أعداد الباحثين والطلاب لكي تسمح لهم بحرية الحركة خلال إجراء التجارب دون تراحم.
- ٢- يجب أن يتوفّر ببابن بقاعة المختبر للدخول والخروج وأن يكون اتجاه فتح الأبواب للخارج.
- ٣- تزود النوافذ بستائر مقاومة للحرق وقضبان حماية متحركة.
- ٤- تجهيز المختبرات بوسائل الإضاءة والتهوية الطبيعية والصناعية ومتابعة الصيانة الدورية لتلك التجهيزات.
- ٥- يجب أن تكون أرضيات المختبرات والأحواض والطاولات من أنواع مقاومة للمواد الكيميائية والحرق.
- ٦- يجب توفير خزانة غازات وذلك لاستخدامها عند تحضير أو استخدام المواد المتطرفة أو الغازات الخطرة أو ذات الرائحة الكريهة.
- ٧- يجب تجهيز المختبر بمقاعد مريحة سهلة الحركة ويمكن التحكم في ارتفاعها.
- ٨- يجب تجهيز المختبرات بعدد كافٍ من نقاط الكهرباء ذات الأغطية.
- ٩- يجب تجهيز المختبرات بنظام غاز وكهرباء ووضع مفتاح للتحكم في مكان ظاهر يمكن الوصول إليه بسهولة في حالة الطوارئ.
- ١٠- يجب أن يزود كل مختبر بغرفة لتخزين الأدوات والأجهزة.
- ١١- يزود كل مختبر بعربة نقل متحركة لنقل الأجهزة والأدوات من غرفة التحضير إلى المختبر وبالعكس.
- ١٢- يجب توفير وسائل السلامة الأولية مثل طفاییات الحریق وصنادوق الإسعافات الأولية ودش غسیل الطوارئ وأجهزة إنذار والاحتفاظ بها بمکان ظاهر وعمل صيانة دورية لها للتأكد من صلاحيتها.

يمكن تقسيم المخاطر في المختبرات إلى:

- ١- مخاطر المواد الكيميائية
- ٢- مخاطر الزجاجيات
- ٣- المخاطر الكهربائية
- ٤- مخاطر حيوية.

١.٢. احتیاطات السلامة من مخاطر الكيماويات:

- ١- معرفة خصائص المادة الكيميائية من خلال العلامات الإرشادية على العبوة.
- ٢- عدم لمس الكيماويات باليد مباشرةً وعدم تذوقها أو استنشاقها.

- ٣- لبس القفازات والبالطو أثناء العمل
- ٤- عدم استخدام الفم لماء الماصة بل يجب استخدام الصاغطة الهوائية
- ٥- عدم تخزين الكيماويات داخل المختبر ولكن يجب وضعها في أماكن تخزين خاصة.
- ٦- التخلص من بوادي المواد الكيميائية بالطريقة المناسبة لكل مادة حسب إرشادات فني المختبر.
- ٧- إجراء التجارب التي يتضاعد منها غازات أو روائح في غرفة الغازات
- ٨- الحذر عند توجيه أنبوبة الاختبار ناحية الوجه أو الجسد أثناء التسخين.
- ٩- إغلاق زجاجات الكيماويات عند الإنتهاء منها وعدم فتح عدة زجاجات في وقت واحد.

١٠٢. العلامات الإرشادية للمواد الكيميائية



علامات تحذيرية للمواد الكيميائية Chemical Warning Signs

١٠٤. احتياطات السلامة من مخاطر الزجاجيات

- ١- تخزين الزجاجيات على رفوف ذات ارتفاع مناسب ليسهل إنقاذه أو إعادةها.
- ٢- حمل الزجاجيات بطريقة مناسبة وبحذر وعدم حمل أكثر من زجاجة واحدة في المرة الواحدة.
- ٣- عدم استخدام زجاجات غير نظيفة أثناء التجارب.
- ٤- عدم لمس الزجاجات أثناء التسخين باليد مباشرةً ويجب استخدام الماسكات المخصصة لذلك.

١.٥. احتياطات السلامة من المخاطر الكهربائية

- ١- يجب أن تكون صنابير المياة بعيدة عن الكهرباء والأجهزة
- ٢- التأكد من خط الكهرباء (١١٠ أو ٢٢٠ فولت) قبل توصيل الأجهزة
- ٣- صيانة الأجهزة بشكل دوري وتنظيفها
- ٤- مراقبة الأجهزة أثناء التشغيل وإطفاءها بعد الانتهاء من الاستخدام


١.٦. إرشادات السلامة في مختبرات قسم الكيمياء الحيوية

- ١- لبس البالطو لحماية ملابسك وجسمك من الكيماويات المنسكبة
- ٢- لبس القفازات المناسبة عند التعامل مع المواد الكيميائية أو العينات
- ٣- لبس الحذاء الواقي يحميك من الأخطار المحتملة
- ٤- وضع نظارة واقية لحماية العينين من المواد الكيميائية
- ٥- إزالة الغترة قبل الابتداء في إجراء التجربة
- ٦- تأدية التجربة بحرص وهدوء يقيك من الحوادث
- ٧- تجنب الأحاديث الجانبية مع زملائك أثناء القيام بالتجربة
- ٨- بلغ فني المختبر عن الحوادث مهما كانت صغيرة
- ٩- أسأل الأستاذ عما لا تعرف
- ١٠- عدم شم أو استنشاق رواح المواد الكيميائية
- ١١- عدم لمس أو تذوق المواد الكيميائية
- ١٢- عدم الأكل أو الشرب داخل المختبرات
- ١٣- عدم التدخين داخل المختبرات
- ١٤- عدم إخراج المواد الكيميائية من المختبر
- ١٥- عدم استعمال أو لمس الأدوات الملوثة بالكيماويات
- ١٦- طلب الإسعافات الأولية فوراً إذا تعرضت لأي حادث لا سمح الله
- ١٧- الالتزام باحتياطيات السلامة الخاصة بكل تجربة
- ١٨- إجراء التجارب التي يتضاعد منها غازات في خزانه شفط الغازات
- ١٩- استخدام التسخين بالحمام المائي بدلاً من اللهب المباشر
- ٢٠- سحب السوائل بطريقة آمنة وباستخدام الماصة
- ٢١- عدم محاوله فك الزجاجيات المستعصية بالقوة
- ٢٢- اقرأ علامات التحذير المدونة على الزجاجات قبل لاستعمال
- ٢٣- غسل اليدين بالماء والصابون دائماً بعد الانتهاء من التجربة
- ٢٤- استخدام المواد المطهرة لتعقيم اليدين
- ٢٥- استخدام المواد المطهرة لتعقيم المكان بعد استخدام العينات
- ٢٦- جعل المساحات التي تعمل بها أو عليها نظيفة.

٢. المحاليل المنظمة Buffer solution


٢.١. الرقم الهيدروجيني pH :

أقترح العالم سورنسن Sorenson طريقة للتعبير عن وسط حموضة المحاليل بإستخدام الرقم الهيدروجيني الذي يعرف بأنه: اللوغاريتم السالب لتركيز أيونات الهيدروجين $[H^+]$ في المحلول .



٢.٢. قياس الرقم الهيدروجيني :

لقياس الرقم الهيدروجيني للمحاليل بدقة نستخدم جهاز خاص يسمى pH meter. يتكون الجهاز من قطبين: الأول يسمى قطب مرجعي يحتوي على محلول مشبع كلوريد البوتاسيوم يعمل اتصالاً كهربائياً بالمحلول، والثاني قطب زجاجي ذو غشاء رقيق على شكل انتفاخ حساس ونفذ لأيونات الهيدروجين. يقيس هذا الجهاز الفرق في الجهد بين القطبين، ويحوله إلى رقم هيدروجيني .




٢.٣. المحاليل المنظمة :

هي المحاليل التي تقاوم التغير في الرقم الهيدروجيني عند إضافة كميات قليلة من الأحماض أو القواعد القوية أو عند تخفيفها، وهي عبارة عن محلول لحمض ضعيف وأحد أملاحه أو قاعدة ضعيفة وأحد أملاحها .

المحاليل المنظمة لها أهمية كبيرة في الأنظمة الكيميائية والبيولوجية بحيث تتميز السوائل الحيوية برقم هيدروجيني ثابت ، ففي جسم الإنسان تختلف قيمة pH من سائل إلى آخر فمثلاً في الدم تبلغ ٧.٤ بينما في العصارة المعدية تبلغ ١.٥ ، هذه القيم تعتبر مناسبة ومثالية لعمل الإنزيمات وموازنة الضغط الأسموزي. هذه القيم يحافظ عليها غالباً عن طريق المحاليل المنظمة وأهم المحاليل المنظمة هي الفوسفات والبيكربونات.

وضع هندرسون - وهاسبلالخ Henderson-Hasselbalch المعادلة الأساسية التي توضح العلاقة بين الرقم الهيدروجيني pH ونسبة الحمض والقاعدة المقتربة. وهذه المعادلة لها أهميتها في فهم عمل وتحضير المحاليل المنظمة. لنفرض أنه يوجد لدينا محلولاً من الحمض الضعيف HA فإن هذا يتفكك لدى إذابته في الماء حسب المعادلة كما يلي:



وعليه فإن قيمة ثابت التفكك للحمض :

$$K_a = \frac{[\text{A}^-][\text{H}^+]}{[\text{HA}]}$$

للحصول على قيمة pH تفصل $[\text{H}^+]$ لوحدها في طرف وتأخذ اللوغاريتم لكل الطرفين الناتجين

$$[\text{H}^+] = \frac{K_a[\text{HA}]}{[\text{A}^-]}$$

$$\log [\text{H}^+] = \log K_a - \log \frac{[\text{HA}]}{[\text{A}^-]}$$

$$\log [\text{H}^+] = \log K_a + \log \frac{[\text{HA}]}{[\text{A}^-]} \text{ Type equation here.}$$

ويضرب الطرفين بـ (-)

$$-\log [\text{H}^+] = -\log K_a - \log \frac{[\text{HA}]}{[\text{A}^-]}$$

$$\text{pH} = \log K_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

$$\text{Or pH} = \log K_a + \log \frac{\text{القاعدة القرinea}}{\text{الحمض القرین}}$$

ويمكن استخدام المعادلة في حساب الرقم الهيدروجيني إذا عرفت نسبة الحمض إلى القاعدة المقتربة و pK_a للحمض. من المعادلة السابقة نجد أن الرقم الهيدروجيني للمحلول المنظم يعتمد على عاملين هما :

١ - قيمة pK_a

٢ - النسبة بين تركيز الحمض والقاعدة المقتربة

٤.٢. سعة محلول المنظم :

تعبر عن مدى مقاومة محلول المنظم للتغير في الرقم الهيدروجيني، وتكون أكبر ما يمكن عندما تكون النسبة بين الحمض والقاعدة المقتربة متساوية للواحد.

من الأمثلة: حمض الخليك acetic acid كحمض ضعيف وقاعدته المقتربة هي خلات الصوديوم sodium acetate

٢.٥ تحضير محلول منظم فوسفاتي Preparation of Phosphate Buffer

المطلوب: تحضير محلول منظم فوسفاتي تركيزه 0.25M و pH=7.4 و ($pK_a = 7.2$)

١ - معرفة مكونات محلول المنظم وهي:

فوسفات الصوديوم ثنائية الهيدروجين NaH_2PO_4 ويعتبر الشق الحمضي (Acid) فوسفات الصوديوم أحدية الهيدروجين Na_2HPO_4 ويعتبر الشق الفاuchi (القاعدة المترنة أو الملح Salt)

٢ - حساب النسبة بين الحمض والملح باستخدام معادلة هندرسون كال التالي :

$$pH = pK_a + \log \frac{[A^-]}{[HA]}$$

$$7.4 = 7.2 + \log \frac{[A^-]}{[HA]}$$

$$7.4 - 7.2 = +\log \frac{[A^-]}{[HA]}$$

$$0.2 = +\log \frac{[A^-]}{[HA]}$$

$$\frac{Na_2HPO_4}{NaH_2PO_4} = 1.6$$

٣ - حساب وزن كلا المادتين كال التالي :

$$\text{وزن } Na_2HPO_4 \times 0.25 \times \frac{1}{2.6} = \text{وزن الجزيئي}$$

..... جرام =

$$\text{وزن } NaH_2PO_4 \times 0.25 \times \frac{1.6}{2.6} = \text{وزن الجزيئي}$$

..... جرام =

٤ - يذاب وزن كلا المادتين في حوالي 500 ml من الماء المقطر في كأس زجاجي .

٥ - يقاس الـ pH للمحلول باستخدام جهاز pH meter، ثم يضبط على الـ pH المطلوب وذلك بإضافة حمض أو قاعدة .

٦ - نكمل الحجم إلى واحد لتر (1000 ml) بالماء المقطر ، ويرج جيدا ثم يوضع في دورق حجمي .

٢٦. دراسة خواص المحاليل Study of properties of Buffer solution

الفكرة الأساسية:

هل يتغير الرقم الهيدروجيني (pH) للمحلول المنظم تغيراً كبيراً أم يقاوم التغير في الرقم الهيدروجيني عند إضافة حمض أو قاعدة إليه ومقاومة ذلك بما يحدث عند إضافة الحمض أو القاعدة إلى الماء المقطر

المواد والأدوات المطلوبة:

١ - كاسين (سعة كل منها 50 ml) ومحرك زجاجي

٢ - جهاز القياس الهيدروجيني pH meter

٣ - محلول منظم فوسفاتي رقم الهيدروجيني $\text{pH}=7.4$ (المحضر بالجزء العلوي السابق)

٤ - حمض هيدروكلوريك HCl مخفف تركيزه 0.1 M

٥ - محلول هيدروكسيد صوديوم NaOH مخفف تركيزه 0.1 M

طريقة العمل:

أولاً: دراسة خواص المحاليل المنظمة باستخدام حمض الهيدروكلوريك HCl 0.1 M

١ - ضع في كأس (أ) 40 ml من الماء المقطر وفي كأس آخر (ب) 40 ml من محلول المنظم الفوسفاتي (الذي تم تحضيره بالجزء العلوي)

٢ - يقاس الرقم الهيدروجيني (pH) لمحتويات كل من الكاسين باستخدام الجهاز الخاص بذلك

٣ - أضاف لمحتويات كل من الكاسين كمية معينة من حمض الهيدروكلوريك المخفف ، وحرك كل من محلولين جيداً بمحرك زجاجي نظيف

٤ - يقاس الرقم الهيدروجيني (pH) لمحتويات كل من الكاسين مرة أخرى

٥ - أعد الخطوة رقم ٣ بإضافة كمية أخرى من حمض هيدروكلوريك المخفف مرة أخرى لمحتويات كل كاس ، وحرك محلولين جيداً بمحرك زجاجي .

٦ - يقاس الرقم الهيدروجيني (pH) لمحتويات كل كأس مرة أخرى .

النتائج:

حجم الحمض 0.1 M	pH للمحلول المنظم	pH للماء المقطر
مدى التغير في pH بعد إضافة الحمض		

الأسئلة:

من خلال نتائج الجدول ، أكمل الجمل التالية :

- نقص pH بعد إضافة الحمض للمحلول المنظم بمقدار ، بينما نقص pH بعد إضافة الحمض للماء المقطر بمقدار

- أيهما تغير له الـ pH بدرجة كبيرة ؟

- أيهما قاوم التغير في الـ pH ؟

ثانياً: دراسة خواص المحاليل المنظمة باستخدام قاعدة هيدروكسيد الصوديوم NaOH 0.1 M

- ملاحظة: أعد التجربة السابقة مع استبدال حمض الهيدروكلوريك بقاعدة هيدروكسيد الصوديوم
- النتائج :

حجم القاعدة 0.1 M	pH للمحلول المنظم	pH للماء المقطر
.....
مدى التغير في pH بعد إضافة القاعدة

من خلال نتائج الجدول ، أكمل الجمل التالية :


- يزيد pH بعد إضافة القاعدة للمحلول المنظم بمقدار ، بينما يزيد pH بعد إضافة القاعدة الماء المقطر بمقدار
- أيهما تغير له الـ pH بدرجة كبيرة ؟

- أيهما قاوم التغير في الـ pH ؟

3. الأحماض الأمينية

Amino Acids

الأحماض الأمينية هي الوحدات الأساسية لبناء البروتينات. وهناك عشرون حمض أميني تم اكتشافها في الطبيعة. كل حمض أميني يحتوي على الأقل على مجموعة أمين (NH_2) ومجموعة كربوكسيل (COOH) ومجموعة طرفية R (تختلف من حمض إلى آخر) وذرة هيدروجين.



تختلف الأحماض الأمينية باختلاف المجموعة الطرفية ولذا أمكن تقسيم الأحماض الأمينية تبعاً لقطبية تلك السلسلة الجانبية (-R-) في المحاليل المائية إلى :

- 1- مجموعة غير قطبية .non polar
- 2- مجموعة مستقطبة متعادلة الشحنة . uncharged polar
- 3- مجموعة قطبية موجبة الشحنة (positively charged)
- 4- مجموعة قطبية سالبة الشحنة (Negatively charged)

3.1. الخواص الكيميائية و الفيزيائية للأحماض الأمينية:

3.1.1. النشاط الضوئي:


تتميز الأحماض الأمينية بقدرتها على عمل انحراف لاتجاه الضوء المستقطب لاحتواها جميعاً (باستثناء الجليسين) على ذرة كربون غير متماثلة (asymmetrical) مرتبطة بأربع مجاميع مختلفة أو أكثر.

لذا فإن جميع الأحماض الأمينية ذات نشاط ضوئي فتحرف الضوء المستقطب الموجه إليها إما إلى اليمين أو إلى اليسار وتتميز جميع الأحماض الأمينية المكونة للبروتين بأنها من النوع L والمقصود بذلك هو ترتيب المجموعات حول ذرة الكربون الغير متناسقة وليس اتجاه الإنحراف، فالنوع يعني أنه عندما تكون مجموعة الكربوكسيل لأعلى فإن مجموعة الأمين توجد ناحية اليسار.

3.1.2. الخاصية الأمفوتيّرية ونقطة التعادل الكهربائي:

جميع الأحماض الأمينية تتميز بالخاصية الأمفوتيّرية أي أنها عندما تذوب في الماء فإنها تحمل شحنتين (شحنة موجبة وأخرى سالبة) مكونة ما يسمى بالأيون مزدوج الشحنة Zwitter ion وتعمل كحمض (معطي للبروتونات) وكقلوي (مكتسب للبروتونات) في نفس الوقت، حيث تكتسب مجموعة الكربوكسيل الشحنة السالبة (COO⁻) لسهولة فقدها البروتون بينما تكتسب مجموعة الأمين الشحنة الموجبة (NH₃⁺) لسهولة ارتباطها بالبروتون المنفصل عن مجموعة الكربوكسيل. إن وجود هذه الحالة من التأين المزدوج يجعل الحمض الأميني قادراً على أن يسلك سلوك الأحماض لوجود مجموعة (COO⁻) وكالقواعد لوجود مجموعة (NH₃⁺).

يحمل الحمض الأميني الشحنة الموجبة في الوسط الحمضي ويحمل الشحنة السالبة في الوسط القاعدي.



وعليه فإن تغيير الأس الهيدروجيني pH للوسط الذي يوجد فيه الحمض الأميني يؤدي إلى تغيير محصلة الشحنات عليه وبالتالي على حركته في المجال الكهربائي.

نقطة التعادل الكهربائي :

هي درجة الأس الهيدروجيني pH الذي تتساوى فيه عدد الشحنات الموجبة والساخة على الحمض الأميني، بمعنى أن تكون محصلة الشحنات تساوي الصفر، وعندما لا يتحرك الحمض الأميني لأي من القطبي السالب أو الموجب إذا وضع في مجال كهربائي وبناءً عليه فإنه يتربّس بسهولة عند هذه الدرجة.

3.1.3. درجة الإنصهار:

وجود الروابط الأيونية القوية بين جزيئات الحمض الأميني لتكوين البلورات يجعلها صعبة الإنصهار فيحتاج إلى تعريضها لدرجات حرارة عالية تصل إلى (٢٠٠°C) فما فوق.

3.2 الاختبارات العامة و الوصفية للأحماض الأمينية (Qualitative tests of amino acids)

3.2.1 اختبار الذوبانية (solubility of amino acid) :

يهدف هذا الإختبار إلى اختبار ذوبان الأحماض الأمينية في المحاليل القطبية و الغير قطبية و الأحماض و القواعد لاستدلال على السلوكقطبي و الخاصية الأمفوتيرية.

النظريّة العلميّة للاختبار :

تنزوب الأحماض الأمينية في الماء لارتباط جزيئاتها المستقطبة بجزيئات الماء القطبية، ووجود المجموعات NH_3^+ الفاعدية و COO^- الحمضية تسهل ذوبان الأحماض الأمينية في القواعد والأحماض.

الأدوات والمُواد:

الأحماض الأمينية: جليسين ، جلوتامين ، لايسين

المذيبات: الماء ، الكلوروفورم ، هيدروكسيد الصوديوم ، حمض الهيدروكلوريك

أنابيب إختبار

طريقة العمل:

- ١- وضع في ٤ أنابيب ٥ مل من كل من المذيبات المذكورة .
- ٢- أضف ٥,٠ جم من الأحماض تحت الاختبار (مع تغيير محتوى الأنابيب عند تغيير الحمض تحت الاختبار في كل مرة).
- ٣- دون الملاحظات في الجدول

الإستنتاج	النتيجة			الأحماض الأنبوب
	لايسين	جلوتامين	جليسين	
				١- ماء
				٢- كلوروفورم
				٣- هيدروكسيد الصوديوم
				٤- حمض الهيدروكلوريك

مناقشة النتائج:

الأسئلة:

مستعين بتركيب كل حمض ، اي الأحماض يذوب في المذيبات المذكورة؟ ولماذا؟


من دراسة الاستنتاج، على ماذا تدل هذه التجربة؟

3.2.2 اختبارات النهيدرين (Ninhydrin test)

يهدف هذا الإختبار إلى التأكد من أن الأحماض الأمينية α تعطي لون بنفسجي مع النهيدرين.

النظرية العلمية للاختبار :

يتفاعل النهيدرين مع جميع الأحماض الأمينية من النوع α (حيث مجموعة الأمين NH_2 مرتبطة بذرة الكربون α) عند درجات حرارة عالية لتكون الهيدرين دانتين و الشادر و يتتصاعد ثاني أكسيد الكربون. ثم يتفاعل الهيدرين دانتين والشادر مع جزئ من النهيدرين معطياً مترافقاً بنفسجي اللون. يستثنى الحمض الأميني البرولين حيث يعطي لون أصفر. هذا الاختبار إيجابي مع النشادر والأمينات والبيوتيدات وكذلك البروتينات.

**المواد والأدوات:**

- محليل أمراض أمينية مجهولة (amino acid solution)، تحضر بإضافة ١٠٠ جم من الحمض الأميني في ١٠٠ مل من الماء المقطر.
- محلول النهيدرين (Ninhydrin solution)، يحضر بإذابة ٢٠٠ مجم في ١٠٠ مل من الإيثانول.
- أنابيب إختبار نظيفة.

طريقة العمل:

١. أضف في كل أنبوب ١ مل من محلول الحمض الأميني المجهول.
٢. أضف ١ مل على كل أنبوبة من محلول النهيدرين.
٣. رج جيداً ثم نضعها في حمام مائي حتى الغليان.
٤. دون الملاحظات.

النتائج:

الاستنتاج	الملاحظة	الأنبوبة

مناقشة النتائج:

الأسئلة:

ما هي الأحماض الأمينية التي تعطي نتيجة إيجابية مع هذا الاختبار؟


ما هي المجموعة الوظيفية المسئولة في الأحماض الأمينية عن إعطاء النتيجة الإيجابية؟

3.2.3. الكشف عن الأحماض الأمينية المحتوية على الكبريت :

هذا الإختبار مميز للأحماض الأمينية المحتوية على مجموعة الكبريت مثل: السيستين ، الميثونين .
الهدف من الاختبار: تحديد الأحماض الأمينية التي تحتوي مجموعات كبريت في سلاسلها الطرفية.

النظرية العلمية للاختبار:

تسخين الأحماض الأمينية التي تحتوي على كبريت مع هيدروكسيد الصوديوم (قاعدة) يحول الكبريت العضوي الى كبريت غير عضوي و الذي يتفاعل مع أسيتات الرصاص معطياً راسب أسود من كبريتيد الرصاص.



المواد والأدوات:

- محليل أحماض أمينية مجهولة، تحضر بإذابة ١٠٠ جم من الحمض الأميني في ١٠٠ مل من الماء المقطر.
- هيدروكسيد الصوديوم (10% NaOH).
- أسيتات الرصاص (5% lead acetate).
- أنابيب إختبار نظيفة.

طريقة العمل:

١. ضع في كل أنبوب ١ مل من محلول الحمض الأميني المجهول.
٢. أضف ١ مل من هيدروكسيد الصوديوم.
٣. أضف ٥,٠ مل من أسيتات الرصاص، ثم رج جيداً.

النتائج:

الاستنتاج	الملاحظة	الأنبوبة
		الستين
		المليونين

مناقشة النتائج:

.....

.....

.....

.....

الأسئلة:

ما هي الأحماض الأمينية التي تعطي نتيجة إيجابية مع هذا الاختبار؟ و أكتب الصيغة البنائية لهذه الأحماض؟

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ما التركيب الكيميائي للراسب الأسود الذي يتكون من هذا الاختبار؟

.....

.....


.....

3.2.4 اختبار مليون (Million test):

الهدف من الاختبار: اختبار خاص بالكشف عن مجموعة الهيدروكسي فينيل.

النظرية العلمية للاختبار:

تتفاعل مجموعة الهيدروكسي فينيل في الحمض الأميني التيروسين مع كاشف مليون (وهو عبارة عن أيونات الزئبق مذابة في أحماض النترات) فيتكون راسببني محمر من أملاح الزئبق . هذا الكشف إيجابي أيضاً مع مركبات الفينول.

**المواد والأدوات:**

- محليل أحماض أمينية مجهولة: تحضر بإذابة ١٠٠ جم من الحمض الأميني في ١٠٠ مل من الماء المقطر.
- كاشف مليون (Million reagent) يحضر بإذابة ١٠٠ جم من نترات الزئبق (mercuric nitrate Hg(NO₃)₂) في ٤٠ مل من حمض النيترิก (nitric acid HNO₃), ثم يخزن في غرفة الغازات، ثم يخفف بإضافة ص XFf حجمه ماء مقطر.
- أنابيب اختبار نظيفة.

طريقة العمل:

- ١- ضع في كل أنبوب ١ مل من محلول الحمض الأميني المجهول.
- ٢- أضف ١ مل من كاشف مليون على كل أنبوبة.
- ٣- رج جيداً ثم ضعها في حمام مائي يغلي لمدة دقيقتين (مع الحذر).
- ٤- دون الملاحظات

النتائج:

الاستنتاج	الملاحظة	الأنبوبة

مناقشة النتائج:

.....

.....

.....

.....

الأسئلة:

ما هي الأحماض الأمينية التي تعطي نتائج إيجابية مع هذا الاختبار؟

.....
.....
.....
.....
.....

ما هي المجموعة الوظيفية المسئولة عن إعطاء النتيجة الإيجابية؟ وهل تقتصر هذه النتيجة على الأحماض الأمينية؟ ولماذا؟


.....
.....
.....
.....
.....

3.2.5. اختبار الزانثوبروتبيك (Xanthoprotic test):

يستخدم هذا الإختبار للكشف عن حلقة البنزين و التي تميز الأحماض الأمينية الأروماتية.

النظرية العلمية للاختبار:

تفاعل الأحماض الأمينية الأروماتية (التربيوفان- الفينيل آلانين - التريوسين) مع حمض النيتريك المركز عند درجات حرارة عالية (بالتسخين) لتعطي مركبات النيترو الصفراء التي تعطي اللون البرتقالي بإضافة هيدروكسيد الصوديوم (محلول قلوي).

**المواد والأدوات:**

- محليل أحماض أمينية مجهرولة، تحضر بإذابة ١٠٠ جم من الحمض الأميني في ١٠٠ مل من الماء المقطر.
- حمض النيتريك المركز.
- هيدروكسيد الصوديوم (10% NaOH).
- أنابيب إختبار نظيفة.

طريقة العمل:

- ١- ضع في كل أنبوبة ١ مل من محلول الحمض الأميني المجهرول.
- ٢- أضف ١ مل من حمض النيتريك المركز.
- ٣- رج جيداً بحذر ثم أضف قطرات من هيدروكسيد الصوديوم.
- ٤- دون الملاحظات

النتائج:

الاستنتاج	الملاحظة	الأنبوبة
		التربيوفان
		الفينيل آلانين
		التيروسين

مناقشة النتائج:

الأسئلة:

ما هي الأحماض الأمينية التي تعطي نتائج إيجابية مع هذا الاختبار؟

ما هي المجموعة الوظيفية المسئولة عن إعطاء النتيجة الإيجابية؟ وهل تقتصر هذه النتيجة على الأحماض الأمينية؟ ولماذا؟

3.2.6 اختبار سكاجوتشي (Sakaguchi test)

يستخدم هذا الإختبار للكشف عن مجموعة الجوانيدin في الأحماض الأمينية .
الهدف من الاختبار: التعرف على حمض الأرجينين و تمييزه عن باقي الأحماض الأمينية.

النظرية العلمية للاختبار:

تتفاعل مجموعة الجوانيدin الموجودة في حمض الأرجينين مع α نافثول في وجود الهيبوبروميت كعامل مؤكسد فيعطي مترافق أحمر اللون يدل على وجود هذه المجموعة.

المواد والأدوات:

- محليل أحماض أمينية مجهولة و الذي يحضر بإذابة ١٠٠ جم من الحمض الأميني في ١٠٠ مل من الماء المقطر.
- هيدروكسيد الصوديوم (10% NaOH).
- α -نافثول (α - naphthol) في ١٠ % الإيثانول .
- محلول هيبوبروميت الصوديوم (5% sodium hypobromite).
- أنابيب إختبار نظيفة.

طريقة العمل:

- ١- ضع في كل أنبوبة ١ مل من محلول الحمض الأميني المجهول.
- ٢- أضف ٢ مل من هيدروكسيد الصوديون ثم رج جيداً.
- ٣- أضف ٢ مل من α - نافثول ثم رج جيداً.
- ٤- أضف ٥ مل من هيبوبروميت الصوديوم.
- ٥- دون الملاحظات

• النتائج:

الأنبوبة	النتيجة	الإستنتاج

الأسئلة:

أكتب الصيغة البنائية للأحماض الأمينية التي تعطي نتيجة إيجابية مع هذا الاختبار؟

.....

.....

.....

.....

.....

.....

فسر أهمية إضافة محلول هيبوبروميت الصوديوم؟

.....

.....

.....

.....

.....

.....

دون نتائج التجارب السابقة على كل من الأحماض الأمينية في الجدول:


الراثنوبروتيك	ساكاجوشي	الكبريت	هوبكنز - كول	ميلون	النهيدين	نتيجة الاختبار
						الحمض الأميني
						جلسين Glycine
						سيرين Serine
						برولين Proline
						تربيوفان Tryptophan
						تيروسين Tyrosine
						فينيل آلانين Phenylalanine
						أرجinin Arginine
						سيستين Cysteine

٤. البروتينات Protein

البروتينات مركبات عضوية ذات أوزان جزيئية كبيرة و هي عبارة عن سلاسل من الأحماض الأمينية المرتبطة بعضها البعض بروابط بيتيدية.

تلعب البروتينات دوراً هاماً في جسم الكائن الحي حيث تدخل في تركيب العديد من المواد البيولوجية المتخصصة مثل الأجسام المضادة والإنزيمات وبعض الهرمونات، كما تساعد في نقل السيالات العصبية والتحكم في التعبير الجيني و هي المكون الأساسي للأنسجة الحية.

يتكون البروتين من سلسلة من الأحماض الأمينية المرتبطة مع بعضها بروابط بيتيدية و فيها ترتبط مجموعة الكربوكسيل في حمض أميني مع مجموعة الأمين في حمض أميني آخر مع إزالة جزء ماء.



تختلف البروتينات عن بعضها البعض في بنائها الكيميائي تبعاً لعدة عوامل:

- عدد ونوع الأحماض الأمينية المكونة لسلسلتها البييتيدية.
- ترتيب وتتابع الأحماض الأمينية.
- ارتباط البروتين مع جزيئات أخرى غير بروتينية.

٤. الأشكال البنائية للبروتين :


تأخذ السلسلة البييتيدية المكونة للبروتين أشكالاً فراغية ناتجة عن التفاف تلك السلسلة معطيةً أربعة تركيب بنائي.

١. التركيب البولي الأولي Primary structure: يعبر عن تسلسل وتتابع الأحماض الأمينية المرتبطة مع بعضها البعض بروابط بيتيدية.

٢. التركيب البولي الثانوي Secondary structure: ينتج عن تكوين روابط هيدروجينية بين المجموعات الطرفية R group للأحماض الأمينية مع بعضها البعض مما يتسبب في التفاف والتواه السلسلة البييتيدية مكونة إما شكل الصفيحة المسطوية B-sheet أو الشكل الحزاوني alpha helix.

٣. التركيب البولي الثلاثي Tertiary structure: ينتج عن تكوين روابط هيدروجينية بين المجموعات الطرفية R group للأحماض الأمينية البعيدة عن بعضها مكونة الشكل الثلاثي الأبعد.

٤. التركيب الرباعي Quaternary structure. وفيه ترتب وحدات مختلفة أو متشابهة من السلاسل البيئية (subunits) مع بعضها البعض لتكون الشكل الرباعي الأبعاد للبروتين. مثل جزء الهيموجلوبين المكون من أربعة وحدات مرتبطة معاً.



والبروتينات في هذا التركيب تصبح قادرة على أداء وظائف بيولوجية. وتشبه البروتينات في خصائصها الفيزيائية والكيميائية تلك الخصائص التي تميز بها الأحماض الأمينية المكونة لها، لذا فالبروتينات خاصية أمفوتيرية في تفاعಲها مع الأحماض فتحمل شحنة موجبة بينما مع القواعد نجد أنها تكتسب شحنة سالبة، ولذا فإن حركتها في المجال الكهربائي تعتمد على قيمة pH للوسط. تبدأ السلسلة البيئية المكونة للبروتينات بالطرف الأميني الحر البروتينات وتنتهي بالطرف الكربوكسيلي.

٤. نقطة التعادل الكهربائي للبروتين :

هي الأس الهيدروجيني pH التي يكون عندها محصلة الشحنات على الجزيء تساوي صفر. نتيجة لتساوي الشحنات الموجبة والسلبية على جزء البروتين وعدد هذه النقطة يصبح البروتين أقل كثافة وأقل ذوبانية فيسهل ترسبيه، وتختلف نقطة التعادل الكهربائي من بروتين إلى آخر حسب الأحماض الأمينية المكونة له.

٤. الاختبارات الوصفية للبروتينات (Qualitative tests of proteins)

٤.٣.١ ذوبان البروتينات (solubility of proteins) :-

- البروتينات الليفية مثل الكيراتينات غير قابلة للذوبان بينما البروتينات الكروية تمثل القسم الأعظم و قابلة للذوبان في المذيبات القطبية والأحماض والقواعد بدرجات مختلفة.
- تكون البروتينات مع الماء محليل غروية نظراً لكبر حجم جزيئات البروتين، بينما في الوسط الحمضي غالباً ما تكتسب جزيئات الشحنة الموجبة فتتلاطم، أما في الوسط القاعدي فتكتسب جزيئات البروتين الشحنة السالبة فتصبح أيضاً قابلة للذوبان.

الهدف من الاختبار: إختبار السلوك الأمفوتيри و الخاصية القطبية لجزيئات البروتين.

المواد والأدوات:

- محليل بروتينات:

(١) البيومين (2% albumin) ، و يحضر من بياض البيض الطازج بإذابته في محلول كلوريد الصوديوم

.(1% NaCl)

(٢) محلول جيلاتين (1% gelatin).

(٣) محلول كازين .(1% casein)

- محلول هيدروكسيد الصوديوم (0.1% NaOH)

- أنابيب إختبار نظيفة.

طريقة العمل:

١- اختبر ذوبان كل من البروتينات (البيومين، جيلاتين، كازين) في كل من الماء البارد والماء الحار و محلول هيدروكسيد الصوديوم (0.1% NaOH).

٢- سجل قابلية ذوبان كل من البروتينات في جدول النتائج .

٣- دون ملاحظاتك وناقش ما لاحظته

النتائج:

البروتين	نوع البروتين	قابلة الذوبان في الماء البارد	قابلة الذوبان في الماء الحار	قابلة الذوبان في 1% NaOH
البيومين	بسيط			
كازين	مرتبط			
جيلاتين	مشتق			

مناقشة النتائج:

.....
.....
.....
.....
.....

الأسئلة:

بما تفسر اختلاف درجات الذوبان من بروتين لآخر؟


.....
.....
.....
.....
.....

٤.٣.٢. اختبار البيوريت (Biuret test)

اختبار عام على البروتينات الذائبة والصلبة. يهدف هذا الاختبار التعرف على البروتينات وتمييزها عن بقية المواد كالكريوهيدرات والليبيادات.

النظريّة العلميّة للاختبار:

يتفاعل البروتين مع محلول كبريتات النحاس في وسط قاعدي فيعطي نتيجة إيجابية فقط عند وجود رابطتين بيتايبتين فاكثر في جزء البروتين. فيتفاعل أيون النحاس(II) مع مجموعتي (-NH-CO-) في الرابطة البيبتيدية مكوناً متراكباً بنفسجي اللون وقد تم تسمية هذا المركب باسم مركب بيوريت لأن البيوريت هو المركب الغير بروتيني الوحيد الذي يعطي نتيجة إيجابية مع هذا الاختبار.

**المواد والأدوات:****- محاليل بروتينات:**

- البيومين (2% albumin)، ويحضر من بياض البيض الطازج بإذابة في محلول كلوريد الصوديوم (1% NaCl).
- محلول جيلاتين (1% gelatin).
- محلول كازين (1% casein).
- كبريتات النحاس (CuSO_4 2%)، يحضر بإذابة 2 جم من كبريتات النحاس في 100 مل ماء مقطر.
- محلول هيدروكسيد الصوديوم (10% NaOH).
- أنابيب اختبار نظيفة.

طريقة العمل:

- 1- ضع في كل أنبوبة 1 مل من محلول البروتين.
- 2- أضف 2 مل من هيدروكسيد الصوديوم ورج جيداً.
- 3- أضف 0.5 مل من كبريتات النحاس ورج جيداً.

النتائج:

الإستنتاج	الملاحظة	الأنبوبة
		اليومين
		جيلاتين
		كارزين

مناقشة النتائج:

.....

.....

.....

.....

.....

الأسئلة:

ما هي البروتينات التي تعطي نتيجة إيجابية مع هذا الاختبار؟

.....

.....

.....

.....

.....

٤.٣.٣. أثر الأملاح على ذوبان البروتين (precipitation of proteins by salts):

يتم ترسيب البروتينات باستخدام المحاليل المركزية للأملاح و يتميز كل بروتين بتركيز معين للملح يتربّس عنده فيتم فصله عن البروتينات الأخرى في المحلول و تسمى هذه العملية **salting out**.
الهدف من الاختبار: بيان أن التراكيز القليلة من الملح قد تساعد على ذوبان البروتينات بينما التراكيز العالية تسبب ترسيب البروتين.

النظرية العلمية للاختبار:

التراكيز المنخفضة من الملح تساعد على إستقرار جزيئات البروتين و إذا انتهت نتيجة للتتجاذب بين أيونات الملح و المجموعات الفعالة في البروتين. بينما في التراكيز العالية فإن أيونات الملح تناقص جزيئات البروتين على الإرتباط بجزئيات الماء فيقل إستقرار البروتين مما يؤدي إلى ترسيبه. وبالرغم من ترسيب البروتينات إلا أنها تحافظ على خصائصها ونشاطها بعد إذابتها وبالتالي فإن هذه الطريقة تستخدم لتنقية البروتينات من محاليلها.

المواد والأدوات المطلوبة:

- البيومين (2% albumin) ، و يحضر من بياض البيض الطازج بإذابته في محلول كلوريد الصوديوم (1% NaCl).
- محلول كلوريد الصوديوم (1% NaCl).
- ماء مقطر.
- محلول مشبع من كبريتات الأمونيوم (767 جم/لتر).
- ملح كبريتات أمونيوم (صلب).

طريقة العمل:

- ١- ضع الألبومين في بيكر و أضف ٣٠٠ مل ماء.
- ٢- يتم إضافة محلول مشبع أو الملح الصلب لكبريتات الأمونيوم بكميات مختلفة.
- ٣- يفصل الراسب بالطرد المركزي (300 rpm) ويحدد وزن الراسب.
- ٤- دون النتائج في الجدول.

النتائج :

إضافة كبريتات الصوديوم	إضافة محلول كبريتات أمونيوم مشبع	يفصل بالطرد المركزي	البيومين + ٣٠٠ مل ماء	البروتين
				ألبومين
				جلوبولين

مناقشة النتائج:

الأسئلة:

ما درجة التشبع التي يتربّس عنها الجلوبولين؟

كيف تفسر أن البروتين لا يتربّس عند تركيزات قليلة من الملح ويزداد ترسّبه كلما زاد تركيز الملح؟

٤.٣.٤. ترسيب البروتينات بأملاح المعادن الثقيلة (precipitation of proteins by salts of heavy metals)
تستخدم هذه الطريقة لفصل البروتينات وتفتيتها دون النظر إلى نشاطها الحيوي.

الهدف من الاختبار:

التعرف على تأثير أملاح الفضة والزئبق على طبيعة تركيب البروتينات ونشاطها الحيوي، وإيضاح خطورة التسمم بالرصاص، وإيضاح إمكانية استخدام البروتينات (الألبومين) كعلاج في حالات التسمم بالزئبق والرصاص.

المواد والأدوات المطلوبة:

- محاليل بروتينات:

- الألبومين (2% albumin) ويحضر من بياض البيض الطازج بإذابة في محلول كلوريد الصوديوم (1% NaCl).
- محلول جيلاتين (1% gelatin).
- محلول كازين (1% casein).
- نترات الفضة (2%) Silver nitrate AgNO_3 ، تحضر بإذابة ٢ جم من نترات الفضة في ١٠٠ مل ماء المقطر.
- كلوريد الزئبق (5%) mercury chloride HgCl_2 .
- أنابيب اختبار نظيفة.

طريقة العمل :

- ١- ضع في كل أنبوب ١ مل من محلول البروتين.
- ٢- أضف ٥٠ مل من نترات الفضة.
- ٣- كرر الخطوات السابقة مع إستبدال نترات الفضة بكلوريد الزئبق ونقارن النتيجة.

النتائج:

الإنتاج	الملاحظة	الأنيوية
		الألبومين
		جيلاتين
		كازين

مناقشة النتائج:

٤.٣.٥. الترسيب بالأحماض القوية (precipitation of proteins with strong acids)**الهدف من التجربة:**

- الكشف عن البروتين في البول بواسطة حمض النيتريل المركب.
- فصل البروتين في محلول ما.
- لإيقاف النشاط الإنزيمي.

النظرية العلمية للاختبار:

تواجد البروتينات في وسط حمضي يكسبها شحنة موجبة فتتجذب جزيئات البروتين إلى أيونات الحمض (NO_3^-) و تعمل على ترسيبها.

المواد والأدوات المستخدمة:

- حمض نيتريك مركب.
- البيومين (2% albumin) و يحضر من بياض البيض الطازج بإذابته في محلول كلوريد الصوديوم (1% NaCl).
- محلول كلوريد الصوديوم (1% NaCl).
- ثلاثي كلوريد حمض الخليك (TCA).

طريقة العمل:

- في الأنبوة الأولى ضع ٢ مل من حمض النيتريل المركب في أنبوب اختبار مع المحافظة على وضع الأنبوة بشكل مائل
- أضف محلول الألبومين قطرة قطرة على جدار الأنبوة ولاحظ تكون الراسب.
- أضف زيادة من الحمض ولاحظ التغيرات في الراسب.
- في الأنبوة الثانية أضف ٢ مل من محلول البيومين مع المحافظة على وضع الأنبوة بشكل مائل،
- أضف ثلاثي كلوريد حمض الخليك قطرة قطرة على جدار الأنبوة ولاحظ تكون الراسب.
- أضف زيادة من الحمض ولاحظ تغيرات الراسب.

النتائج:

الإستنتاج	النتيجة
	مع حمض النيتريل
	مع ثلاثي كلوريد حمض الخليك

- دون نتائج التجارب السابقة على كل من البروتينات في الجدول:

كازين	جيلاتين	البيومين	البروتين الاختبار
			الذوبانية
			البيوريت
			نترات الفضة
			كلوريد الزئبق
			حمض الخليك
			TCA حمض

٤.٤. التقدير الكمي للبروتينات Quantitative Proteins Estimation

تقدير البروتينات كمياً يساعد على معرفة التراكيز القياسية لبروتينات معينة كما أن له دلالات تشخيصية عند إرتفاع أو انخفاض تركيز البروتينات عن المستوى الطبيعي، وله أهمية في معرفة المحتوى البروتيني للعينات الغذائية.

تعتبر مقدرة الجزيئات على امتصاص أطيف الضوء من أكثر الطرق الكيموحيوية المستخدمة في تقدير كميات الجزيئات في محاليلها، ومن هذه الجزيئات المهمة على مستوى الخلية الحية هي البروتينات التي لها القدرة على الإمتصاص الضوئي لوجود بعض الأحماض الأمينية الحلقة العطرية (تربيوفان - فينيلalanine - تيروسين).

هناك أجهزة خاصة لقياس امتصاص الطيف الضوئي تسمى اسبيكتروفوتوميتر (spectrophotometer) يمكن من خلالها تقدير البروتينات عند طول موجي معين.

٤.٤.١. طريقة لاوري (Lowry method)

تقدير البروتينات بطريقة لاوري هي من الطرق الشائعة و ذلك لسهولتها و سرعة إجرائها و كذلك لحساسيتها العالية فهي تستخدم في تقدير البروتينات المخففة عندما يكون تركيزها منخفض.

و تعتبر طريقة لاوري تطوير و مشتقة من طريقة ببوريت للكشف عن البروتينات.

النظرية العلمية للاختبار:

عند معاملة البروتين بمحلول كبريتات النحاس في وسط قاعدي فإن أيون النحاسيك يكون معقد مع الرابطة البنتيدية في البروتين ويسمى معقد ببوريت، وهذا المعقد يختزل محلول فولن (الذي يتكون من أملاح معقدة من تجستنات فوسفومليبيات) ليعطي لون أزرق يمكن قياس الإمتصاص الضوئي له عند طول موجي 750nm.

يجب إعداد منحنى قياسي (standard curve) لبروتينات معلومة التراكيز و ذلك لإستخدامه في تقدير البروتينات مجهرة التراكيز. يمكن من المنحنى القياسي حساب تركيز البروتينات المجهولة بمعرفة مقدار الإمتصاص الضوئي لها.

المواد والأدوات المطلوبة:

- محليل البيومين سيرم الدم معلومة التراكيز، تحضر بتراكيز (50, 100, 150, 200, 250 ug/ml).
- محلول بروتين مجهول التركيز (تحضر في نطاق التراكيز المعلومة).
- محلول (a) يحتوي على كربونات الصوديوم (2% Na₂CO₃)، وهيدروكسيد الصوديوم (0.1 M NaOH).
- محلول (b) يحتوي على كبريتات النحاسيك (0.5% CuSO₄) و طرطرات الصوديوم و البوتاسيوم (1% sodium potassium tartarate).
- محلول كبريتات النحاس الفاعدية، وينتج عن خلط ٥ مل من محلول (a) من ١ مل من محلول (b) ويجب أن يتم الخلط بين محلولين قبل إجراء التجربة مباشرة.
- محلول فولن، يجب تخفيف محلول التجاري بالماء المقطر بنسبة ١:١ قبل الاستعمال.
- جهاز سبكتروفوتوميتر و يضبط على طول موجي nm 750 .
- ماسكات أوتوماتيكية
- أنابيب اختبار نظيفة عدد ٨ أنابيب.


طريقة العمل: ضع مجموعة من أنابيب الإختبار وأتبع الجدول التالي :

رقم الأنبوة									المحلول
٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١		
								١ مل	ماء مقطر
							١ مل		البروتين القياسي 50 ug/ml
						١ مل			البروتين القياسي 100 ug/ml
					١ مل				البروتين القياسي 150 ug/ml
				١ مل					البروتين القياسي 200 ug/ml
		١ مل							البروتين القياسي 250 ug/ml
	١ مل								البروتين A المجهول
١ مل									البروتين B المجهول
٥ مل	٥ مل	٥ مل	٥ مل	٥ مل	٥ مل	٥ مل	٥ مل	٥ مل	محلول كبريتات النحاس القاعدية
رج الأنبيب لمزج محتوياتها وننتظر ١٠ دقائق									
كافش فولن	٠.٥ مل	رج الأنبيب لمزج محتوياتها وننتظر ١٠ دقائق							
قياس الإمتصاص الضوئي عند طول موجي 750 nm									

النتائج :

الأنبوبة	تركيز البروتين ug/ml	الإمتصاص الضوئي عند 750nm
١	.	
٢	٥٠	
٣	١٠٠	
٤	١٥٠	
٥	٢٠٠	
٦	٢٥٠	
A		بروتين مجهول A
B		بروتين مجهول B

- إرسم منحنى قياسي يوضح العلاقة بين تركيز البروتين (على المحور الأفقي) و الإمتصاص الضوئي (على المحور الرأسي) وذلك على ورقة رسم بياني.
- إستنتج من الرسم البياني تركيز محلول البروتين المجهول وذلك بمعلومية الإمتصاص الضوئي له.



ملاحظة: إذا لم يرد عمل منحنى قياسي نكتفي بتحضير محلول بروتيني قياسي واحد فقط ثم نستخدم المعادلة الحسابية التالية لحساب تركيز محلول بروتيني مجهول:

$$\text{تركيز محلول البروتين المجهول} = \frac{\text{مقدار الإمتصاص الضوئي لمحلول البروتين المجهول التركيز } X \text{ البروتين القياسي}}{\text{مقدار الإمتصاص الضوئي لمحلول البروتين القياسي}}$$

الأسئلة:

ما نوع العلاقة بين تركيز البروتين والإمتصاص الضوئي له؟

.....

.....

.....

.....

قارن بين قيمة تركيز البروتين المجهول المستندة بواسطة المنحنى القياسي أو المعادلة الحسابية؟ وأيهما أدق في النتيجة؟

.....

.....

.....

.....

5. الإنزيمات Enzymes

الوظيفة الأساسية التي تقوم بها الخلايا الحية في الكائن الحي هي إنشاء مركبات معقدة من مواد بسيطة والعكس ، أي تفكك تلك المركبات المعقدة إلى مواد أبسط ، إن هذه القدرة التي تتمتع بها الخلايا على تكوين مواد عضوية معقدة من مواد أخرى أبسط تركيباً (أو العكس) تحتاج لعدد كبير من التفاعلات الكيميائية المختلفة، وتتضح هذه التفاعلات لآليات تحكم في سرعتها واتجاهها عن طريق جزيئات متخصصة تسمى الإنزيمات، التي يعتمد عملها على تسريع التفاعلات الكيميائية داخل الخلية وتنظيمها بدقة بحسب حاجة الخلايا .

فالإنزيمات عوامل مساعدة عضوية حيوية تصنع داخل الخلية ، تقوم بعملها من خلال تحفيز التفاعلات داخل الخلية بطريقة تخصصية، أي أن كل إنزيم يقوم بتنشيط تفاعل محدد أو أكثر من خلال العمل على مادة معينة أو مجموعة مواد متشابهة كيميائياً دون غيرها، فالتخصص ؛ رغم اختلاف درجة تقاوته من إنزيم لآخر؛ يحمي مادة الخلية نفسها ومكوناتها من الهدم، مع ملاحظة أن عملية التنشيط التي يقوم بها الإنزيم تعني أن الإنزيم لا يتفاعل بنفسه ولا يتأثر بنتائج التفاعل.

تتركب الإنزيمات في تكوينها من بروتينات بغض النظر عن اسمها ويمكن تقسيمها من حيث التركيب إلى نوعين :

- ١- الإنزيمات البسيطة: وهي كأي بروتينات بسيطة عبارة عن سلسلة من الأحماض الأمينية المتالية .
- ٢- الإنزيمات المرتبطة: وهي التي تتكون من شقين ، أحدهما بروتيني والأخر غير بروتيني . علماً بأن المجموعات غير البروتينية هي جزء من المركز الفعال في الإنزيم، وتسمى في هذه الحالة باسم " المراافق الإنزيمي " Co-Enzyme أو بالعامل المعاون Co-Factor ، وهذه الأجزاء غير البروتينية ضرورية لنشاط هذه الإنزيمات .

5.1. العوامل المؤثرة في نشاط الإنزيمات :

- ١- تركيز الإنزيم.
- ٢- تركيز المادة الدالة في التفاعل التي يعمل عليها ذلك الإنزيم.
- ٣- درجة الحرارة التي يحدث فيها التفاعل.
- ٤- درجة الأس الهيدروجيني للوسط (قيمة pH) .
- ٥- وجود مواد مثبطة (inhibitors) تعيق عمل الإنزيم أو تقلل نشاطه الحيوي.


5.2. مبدأ دراسة نشاط الإنزيمات بطريقة عملية :

لنتذكر مسبقاً قوله من أن الإنزيم لا يدخل في التفاعل، ولهذا فإن دراسة نشاطه عملياً تتم من خلال قياس وتتبع المواد المتفاعلة ومدى نقصها أو اخراقها، وكذلك باختبار ظهور نواتج التفاعل أو زیادتها. فمن الواضح أن إخقاء المواد المتفاعلة أو نقصها، وظهور نواتج التفاعل أو تزايدها يدل على أن الإنزيم نشط في تحفيزه للتفاعل في الظروف المناسبة للتفاعل .

٥.٣ الاختبارات الوصفية للكشف عن نشاط بعض الإنزيمات : Qualitative tests of Enzyme activity

٥.٣.١ إنزيم الأميليز : α-Amylase

تفرزه الغدد اللعابية في الفم، ليقوم بتحليل النشائى سكريات أحادية (جلوكوز) ، من خلال تفاعل يأخذ عدة خطوات :



هدف الاختبار :

- ١- متابعة نشاط الإنزيم ألفا أميليز.
- ٢- الكشف عن الطبيعة الكيميائية للإنزيم.
- ٣- دراسة الخصوصية الإنزيمية تجاه مادة التفاعل Substrate.
- ٤- دراسة أثر درجات الحرارة المختلفة على نشاط الإنزيم.

٥.٣.١.١ اختبار نشاط إنزيم الأamiliz:

النظريّة العلميّة للاختبار :

في هذه التجربة سوف يتم تحضير مستخلص خام من إنزيم الأamiliz من اللعاب .
والأس الهيدروجيني الأمثل لنشاطه هو ٦.٧ .

ونختبر بقاء النشا أو اختفائه ، وكذلك نختبر ظهور الجلوكوز من عدمه. هذا وسبق أن درسنا اختبار اليود لفحص وجود النشا ، واختبار بينديكت للسكر الأحادي المختزل .

المواد والأدوات :

- أنابيب اختبار نظيفة .
- محلول نشا 1% starch .
- محلول إنزيم الأamiliz من اللعاب Salivary Amylase : يحضر بمضمضة الفم بالماء عدة مرات ووضعه في كأس صغير.
- محلول اليود Iodine Solution : يذاب ٢٥ مجم من اليود في ١٠٠ مل من محلول يوديد البوتاسيوم ٢% .
- كاشف بينديكت .

- محلول كبريتات النحاس . 2% CuSO_4
- محلول هيدروكسيد الصوديوم 10% NaOH

طريقة العمل:

- ١- حضر ٣ أنابيب اختبار (أ، ب، ج)
- ٢- حضر كل أنبوبة كما يلي:
أنبوبة (أ):

١٥ نقطة من المستخلص الإنزيمي

١٥ نقطة من محلول النشا

أنبوبة (ب):

١٥ نقطة من المستخلص الإنزيمي

١٥ نقطة من الماء المقطر

أنبوبة (ج):

١٥ نقطة من محلول النشا

١٥ نقطة ماء مقطر

- ٣- ضع في حمام مائي درجة حرارته ٣٧ درجة مئوية لمدة دقيقتين
- ٤- يُجرى اختبار اليود لمعرفة بقاء النشا أو اختفائه .
- ٥- يُجرى اختبار بينيديكت لمعرفة ظهور الجلوكوز أم لا ، مع ملاحظة أن كاشف بينيديكت يحتاج غليان بعد إضافته لمدة ٣ دقائق ؛ كما سبق في درس السكريات .

الأنبوبة	الاختبار		
الأنبوبة الأولى	اليود (أ)		
الأنبوبة الثانية	بيينيديكت (ب)		
الأنبوبة الثالثة	اليود (أ)		
	بيينيديكت (ب)		

تحليل النتائج :

- في حالة الأنبوة التي لم يتغير فيها لون البود وهو البني، فإننا نستنتج اختفاء النشا، أي أنه تكسر إلى الجلوكوز ، وهذا بدل على أن الإنزيم فعال وسليم، ودفع بالتفاعل في هذه الحالة حتى اختفى النشا.
 - إذا تغير لون كاشف بيبيديكت إلى اللون البني أو الأحمر الغامق (أو راسب خفيف) فيعني ذلك ظهور سكريات مختزلة، أي أن النشا تحلل إلى جلوكوز ، وهو ما يدل على أن الإنزيم فعال وسليم.
- إذا بقي لون كاشف بيبيديكت أزرق كما هو، فمعناه أنه لم تنتج سكريات أحادية مختزلة، أي أن النشا بقي سليماً لم يتأثر لعدم وجود الإنزيم.

سؤال : في أي الحالتين وجدت أن الإنزيم غير قادر على تحليل النشا ؟ ولماذا ؟

.....

.....

.....

.....

5.3.1.2 اختبار الطبيعة الكيميائية لإنزيم الأميليز:

١- حضر ٤ أنابيب (أ، ب، ج، د)

٢- حضر كل أنبوبة كما يلى:

أنبوبة (أ):

١٥ قطرة من المستخلص الإنزيمي

١٥ قطرة من المادة المتفاعلة (النشا)

رج الأنبوة وضعها في حمام مائي 37°C لمدة ١٠ دقائق. ضع هذه الأنبوة على جنب كمقياس بحيث تقارن فيه نتائج كلاً من ب، ج، د.

يُجرى اختبار اليود لمعرفة بقاء النشا أو اختفاءه على جميع الانابيب.

أنبوبة (ب):

أضيف ١٠ قطرات من المستخلص الإنزيمي

أضيف ١٠ قطرات من التربسين

رج الأنبوة جيداً ثم ضعها في حمام مائي 37°C لمدة ١٠ دقائق

أضيف ١٠ قطرات النشا ثم أعدها إلى نفس الحمام المائي لمدة ١٠ دقائق. افحص الأنبوة وقارنها بأنبوبة أ.

دون مشاهدتك.

أنبوبة (ج):

أضاف ١٠ قطرات من المستخلص الإنزيمي

أضاف ١٠ قطرات من ثلاثي كلورو حمض الخليك

رج الأنبوة جيداً ثم انتظر ٥ دقائق بعد ذلك أضاف ١٠ قطرات من محلول النشا

ضع الأنبوة في حمام مائي 37°C لمدة ١٠ دقائق وقارن الأنبوة بأنبوبة أ.**أنبوبة (د):**

١- أضاف ١٠ قطرة من المستخلص الإنزيمي

٢- أضاف ٢٠ قطرة من هيدروكسيد الصوديوم ، ورج جيداً .

أضاف ٥ قطرة من كبريتات النحاس ، ورج جيداً .

ثم ضع الأنبوة في حمام مائي عند 37°C لمدة ١٠ دقائق

سجل مشاهدتك بالجدول الخاص بالنتائج.

ملاحظة:

*إنزيم الترسيبين هو إنزيم يعمل على تحلل البروتينات وذلك بواسطة تحليله للروابط البيئية.

*ثلاثي كلورو حمض الخليك يستخدم عادة في المعامل حيث يعمل على مسخ "تغير طبيعة البروتينات" denaturation ويعمل على ترسيبها شاملاً في ذلك الإنزيمات

*اختبار البيوريت ، كاشف عام للبروتينات وهذا نجri التجربة المذكورة على محاليل إنزيمات ، فإن ظهرت نتيجة إيجابية تكون قد تحققتنا من أن الإنزيم عبارة عن بروتين في طبيعته الكيميائية

الاستنتاج	المشاهد	الانبوب
		أ- مقاييس
		ب-ترسيبين
		ج-ثلاثي كلورو حمض الخليك
		د

الأسئلة :

أكمل الفراغات التالية :

- ١- الكاشف العام على البروتينات هو اختبار
- ٢- نستنتج من النتائج السابقة أن الإنزيمات عبارة عن مواد ، لأنها أعطت نتيجة مع اختبار البيوريت .
- ٣- جميع الإنزيمات عبارة عن ، بينما ليس جميع البروتينات

5.3.1.3. اختبار خصوصية مادة التفاعل لإنزيم الأميليز:

- ١- حضر ٣ أنابيب (أ، ب، ج)
- ٢- أضف ١٠ قطرات من المستخلص الإنزيمي لكل أنبوبة
- ٣- أضيف ماليزي:
أنبوبة (أ):

أضف ١٥ قطرة من محلول النشا

أنبوبة (ب):

أضيف ١٥ قطرة من محلول الجليكوجين

أنبوبة (ج):

أضيف ١٥ قطرة من السكرورز

رج الأنابيب بخفة وضعها في حمام مائي 37°C

ثم سجل لون كل أنبوبة

٤- يُجرى اختبار اليود بعد ٥ دقائق وبعد ١٠ دقائق لمعرفة بقاء النشا أو اختفائه .

٥- يُجرى اختبار بينيديكت لمعرفة ظهور الجلوكوز أم لا ، مع ملاحظة أن كاشف بينيديكت يحتاج غليان بعد إضافته لمدة ٣ دقائق ؛ كما سبق في درس السكريات .

الاستنتاج	المشاهد	المادة المتفاعله
		النشا
		الجليكوجين
		السكرورز

5.3.1.4. اختبار تأثير درجة الحرارة على نشاط إنزيم الأميليز:

حضر ٣ أنابيب (أ ، ب ، ج)

- ١- أضيف ١٥ قطرة من المستخلص الإنزيمي وضعها في حمام مائي لمدة ١٠ دقائق عند درجات مختلفة

أنبوبة (أ) عند صفر درجة مئوية "وعاء به ثلج"

أنبوبة (ب) عند 37°م أنبوبة (ج) عند 70°م

- ٢- أضيف ١٥ قطرة من محلول النشا في كل أنبوبة
 ٣- رج كل أنبوبة بخفة وسرعه أعدها إلى الحمام المائي الخاص بها
 ٤- انتظر ١٠ دقيقة ثم أجري اختبار اليود وبنديكت وسجل ملاحظاتك على اللون في الجدول الخاص بالنتائج.
 ملاحظه: الأنبوه ج لابد أن تبرد لنجري اختبار اليود

النتائج:

الاستنتاج	المشاهد	الأنبوبه
		أنبوبة (أ) عند صفر درجة مئوية "
		أنبوبة (ب) عند 37°م
		أنبوبة (ج) عند 70°م

سؤال : في أي الحالتين وجدت أن الإنزيم غير نشط ؟ ولماذا ؟

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

5.3.2 : إنزيم السكريز (Invertase)

أحد إنزيمات العصارة المعدية التي تفرزها خلايا الأمعاء الدقيقة ليقوم بتحليل السكروز (سكر ثانوي) إلى الجلوكوز والفركتوز (سكريات أحادية).



النظرية العلمية لاختبار:

السكروز سكر ثانوي غير مختزل، متكون من إرتباط جزيئين مختلفين من سكريات مختزلة (الجلوكوز والفركتوز)، يتحلل تحت تأثير إنزيم السكريز، ويمكن الكشف عن نشاط هذا الإنزيم بالكشف عن تكون سكريات مختزلة وذلك عن طريق تجربة بينيديكت.

المواد والأدوات :

- محلول السكروز 10% .
- محلول إنزيم السكريز ، يحضر من الخميرة .
- كاشف بينيديكت .

طريقة العمل :

- ١- ضع في حامل أنبوبتين نظيفتين، وضع في كل منها ١ مل من محلول إنزيم السكريز .
- ٢- ضع إداهاما في حمام مائي يغلي، واتركها تغلي مدة ١٠ دقائق على الأقل (الأنبوبة الأولى)، بينما يجب أن تبقى الأخرى بدون غليان (الأنبوبة الثانية). .
- ٣- بعد أن تُبرد الأنبوة الأولى بفتح صنبور الماء عليها قليلاً، أضف إلى الأنبوبتين كلاًّهما ٢ مل من محلول السكروز مع الرج .
- ٤- ضعهما في حمام مائي درجة حرارته ٣٧ درجة مئوية لمدة دقيقتين .
- ٥- يُجرى اختبار بينيديكت على الأنبوبتين لمعرفة ظهور السكريات المختزلة (الجلوكوز والفركتوز)، مع ملاحظة أن كاشف بينيديكت يحتاج غليان بعد إضافته لمدة ٣ دقائق ؛ كما سبق في درس السكريات .

اختبار بينديكت :

الاستنتاج	المشاهدة	الأنيوبة حالة الإنزيم
		الأنيوبة الأولى (سكروز + إنزيم السكرizin الذي تعرض (للحليان)
		الأنيوبة الثانية (سكروز + إنزيم السكرizin)

تحليل النتائج :

- إذا تغير لون كاشف بینیدیکت إلى اللون البنی أو الأحمر الغامق (أو راسب خفیف) فيعني ذلك ظهور سكريات مختزلة، أي أن السکروز تحل إلى جلوكوز وفركتوز، وهو ما يدل على أن الإنزيم فعال.
- إذا بقي لون كاشف بینیدیکت أزرق كما هو، فمعناه أنه لم تنتج سكريات أحادية مختزلة ، أي أن السکروز بقي سلیماً لم يتأثر لعدم فعالية الإنزيم، لأن هذا الأخير جرى تدميره بالحليان في بداية التجربة .

5.3.3. إنزيم بولي فينول أكسيداز Polyphehol Oxidase


الغرض من التجربة:

- ١- متابعة نشاط الإنزيم من مستخلص خام محضر من البطاطا.
- ٢- الكشف عن الطبيعة الكيميائية للإنزيم.
- ٣- دراسة الخصوصية الإنزيمية تجاه مادة التفاعل Substrate.
- ٤- دراسة أثر درجات الحرارة المختلفة على نشاط الإنزيم.

مقدمة:


عندما ضع في اعتبارنا التفاعلات الإنزيمية في الخلية الحية فإن المواد المتفاعلة التي يعمل عليها الإنزيم ليحولها إلى نواتج تسمى المادة الأساس (S) Substrate.

بعض التفاعلات الإنزيمية تكون عكسيّة وتتضمن تكوين وسيط هو مركب E-S



كما أن جزء الإنزيم الواحد على الرغم من أنه يستطيع أن يتفاعل المرة تلو الأخرى إلا أنه لا يستطيع أن يرتبط إلا مع عدد معين من جزيئات المادة المتفاعلة في الدقيقة الواحدة وهذا يسمى بـ "عدد التحول" Turn over no. وعدد التحول هذا يختلف من إنزيم لأخر.


ترتبط مادة التفاعل بموقع معين على سطح الإنزيم يسمى بالموقع النشط مكوناً المعقد الإنزيمي + مادة التفعّل (ES complex)



فرضية التطابق المستحسن تفترض أن الاختلافات في الشكل الثلاثي الأبعاد لسطح الموقع النشط أساسي لخصوصية الإنزيم أي أنه يوجد فقط نوع معين من مادة التفاعل تستطيع أن تحقق تطابق مع نوع معين من الإنزيمات.

النظرية العلمية للاختبار:

في هذه التجربة سوف يتم تحضير مستخلص خام من إنزيم بولي فينول أكسيديز Polyphenol Oxidase. يحتوي هذا الإنزيم على النحاس، والأس الهيدروجيني الأمثل لنشاطه هو ٦.٧. هذا الإنزيم يعتبر عامل مساعد في عملية الأكسدة لثاني وثلاثي هيدروكسي الفينول إلى quinons كما في التفاعل الآتي:



تفاعل الأكسدة والاختزال هذا يصاحبه تغير في اللون، كما أن هذا التفاعل نصادفه كثيراً في الطبيعة حيث هو المسؤول عن اللون البني الذي يظهر على البطاطا بعد تقشيرها.

سنتابع في هذه التجربة تطور التفاعل الإنزيمي بطريقة بسيطة وكيفيته وذلك بواسطة التغير في اللون وسيعبر عنه كما هو موضح هنا.

الرمز	درجة كثافة اللون في أنبوبة الاختبار
(-)	عدم اللون
(+)	لون باهت
(++)	لون واضح
(+++)	لون غامق

كثافة اللون الناتج يتاسب طردياً مع النشاط الإنزيمي في أنبوبة الاختبار التي تحت الفحص.

5.3.3.1 اختبار النشاط الإنزيمى للبولى فينول أكسيديز:

١- حضر ٣ أنابيب اختبار (أ، ب، ج)

٢- حضر كل أنبوبة كما يلى:

أنبوبة (أ):

١٥ نقطة من المستخلص الإنزيمى

١٥ نقطة من محلول الكاتيكول ٠٠١ مول/لتر

أنبوبة (ب):

١٥ نقطة من المستخلص الإنزيمى

١٥ نقطة من الماء المقطر

أنبوبة (ج):

١٥ نقطة من محلول الكاتيكول ٠٠١ مول/لتر

١٥ نقطة ماء مقطر

٣- ضع الأنابيب الثلاثة في حمام مائي ٣٧ ° م

٤- رج كل أنبوبة ٥ دقائق لتهويتها وذلك لإضافة الأوكسجين للمحلول.

٥- عرض الأنابيب للضوء كل ٥ دقائق بعد الرج وافحصها ثم سجل اللون الذي شاهدته في كل أنبوبة تبعاً للرموز المعطاة سابقاً. استمر في الفحص لمدة ٢٥ دقيقة.

النتائج:

كثافة اللون +، ++، +++)			زمن التحضين بالدقائق
ج	ب	أ	
			٠
			٥
			١٠
			١٥
			٢٠
			٢٥

5.3.3.2 اختبار الطبيعة الكيميائية لإنزيم بولي فينول أكسيديز:

١- حضر ٤ أنابيب (أ، ب، ج، د)

٢- حضر كل أنبوبة كما يلي:

أنبوبة (أ):

١٥ قطرة من المستخلص الإنزيمي

١٥ قطرة من الكاتيكول

رج الأنبوة وضعها في حمام مائي 37°C لمدة ١٠ دقائق. ضع هذه الأنبوة على جنب كمقاييس بحيث تقارن فيه نتائج كلاً من ب، ج، د

أنبوبة (ب):

أضيف ١٠ قطرات من المستخلص الإنزيمي

أضيف ١٠ قطرات من التربسين

رج الأنبوة جيداً ثم ضعها في حمام مائي 37°C لمدة ١٠ دقائق

أضيف ١٠ قطرات من محلول الكاتيكول ثم أعدها إلى نفس الحمام المائي لمدة ١٠ دقائق. افحص الأنبوة وقارنها بأنبوبة أ. دون مشاهدتك.

أنبوبة (ج):

أضيف ١٠ قطرات من المستخلص الإنزيمي

أضيف ١٠ قطرات من ثلاثة كلورو حمض الخليك

رج الأنبوة جيداً ثم انتظر ٥ دقائق بعد ذلك أضف ١٠ قطرات من محلول الكاتيكول

ضع الأنبوة في حمام مائي 37°C لمدة ١٠ دقائق وقارن الأنبوة بأنبوبة أ.

أنبوبة (د):

أضيف ١٥ قطرة من المستخلص الإنزيمي

أضيف بضعة بلورات من phenyl thiourea

رج الأنبوة جيداً واستمر في الرج لمدة ٥ دقائق

ثم أضف ١٥ قطرة من محلول الكاتيكول

ثم ضع الأنبوة في حمام مائي عند 37°C لمدة ١٠ دقائق

قارن هذه الأنبوة مع أنبوبة أ. سجل مشاهدتك بالجدول الخاص بالنتائج.

إنزيم التربسين هو إنزيم يعمل على تحلل البروتينات وذلك بواسطة تحليله للروابط الببتيدية.

ثلاثي كلورو حمض الخليك يستخدم عادة في المعامل حيث يعمل على مسخ "تغير طبيعة البروتينات denaturation" وي العمل على ترسيبها شاملاً في ذلك الإنزيمات

مادة phenyl thiourea لها ميل كيميائي قوي تجاه عنصر النحاس في إمكانه الارتباط به حتى ولو كان مرتبطاً.

الأنبوبة	المادة المضافة	كثافة اللون +، ++، +++, +++
أ	مقياس	
ب	تربيسين	
ج	ثلاثي كلورو حمض الخليك	
د	Phenylthiourea	

5.3.3.3 اختبار خصوصية مادة التفاعل لإنزيم بولي فينول أكسيداز:

- ١- حضر ٣ أنابيب (أ، ب، ج)
- ٢- أضف ١٠ قطرات من المستخلص الإنزيمي لكل أنبوبة
- ٣- أضيف ماليكي: أنبوبة (أ):

أضف ١٥ قطرة من محلول الكاتيكول

أنبوبة (ب):


أضيف ١٥ قطرة من محلول الفينول

أنبوبة (ج):


أضيف ١٥ قطرة من هيدروكينون

- ٤- رج الأنابيب بخفة وضعها في حمام مائي ٣٧ °م
- ٥- افحص الأنابيب بعد ٥ دقائق وبعد ١٠ دقائق ثم سجل لون كل أنبوبة


التركيب الكيميائي للثلاث مركبات متقاربة



Catechol



Phenol



Hydro quinone

المادة الأساسية	كثافة اللون +، ++، +++, +++
كاتيكول	١٠ دقائق
فينول	
هيدروكينون	

5.3.3.4. اختبار تأثير درجة الحرارة على النشاط إنزيم بولي فينول أكسيديز:

- ١- حضر ٣ أنابيب (أ ، ب ، ج)
- ٢- أضيف ١٥ قطرة من المستخلص الإنزيمي وضعها في حمام مائي لمدة ١٠ دقائق عند درجات مختلفة

أنبوبة (أ) عند صفر درجة مئوية "وعاء به ثلج"

أنبوبة (ب) عند ٣٧ °م

أنبوبة (ج) عند ٧٠ °م

٣- أضيف ١٥ قطرة من محلول الكاتيكول في كل أنبوبة

٤- رج كل أنبوبة بخفة وسرعه أعدها إلى الحمام المائي الخاص بها

٥- انتظر ١٥ دقيقة ثم افحص كل أنبوبة بدون إخراجها من حمامها المائي وسجل ملاحظاتك على اللون في الجدول الخاص بالنتائج.

النتائج:

كثافة اللون +،++،+++,+++	درجة الحرارة °م
	.
	٣٧
	٧٠

سؤال : في أي الحالتين وجدت أن الإنزيم غير نشط ؟ ولماذا ؟

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5.3.4. الكشف عن الطبيعة الكيميائية للإنزيمات:

النظريّة العلميّة لاختبار:

سبق في دراسة البروتينات معرفة الكاشف العام لها ، فقد أجري اختبار البيوريت ، والمبدأ هنا أن نجري التجربة المذكورة على محليل إنزيمات ، فإن ظهرت نتيجة إيجابية تكون قد تحققت من أن الإنزيم عبارة عن بروتين في طبيعته الكيميائية .

المواد والأدوات :

- محلول إنزيم الأميليز و محلول إنزيم السكريز .
- محلول كبريتات النحاس $CuSO_4$ 2% .
- محلول هيدروكسيد الصوديوم $NaOH$ 10% .
- أنابيب اختبار نظيفة .

طريقة العمل :

- ١- ضع في أنبوبة ١ مل من إنزيم الأميليز ، وفي أنبوبة أخرى ١ مل من إنزيم السكريز .
- ٢- أضف لكل منها ٢ مل من هيدروكسيد الصوديوم ، ورج جيداً
- ٣- أضف ٥.٠ مل من كبريتات النحاس ، ورج جيداً .

الاستنتاج	المشاهدة	الأنبوبة
		إنزيم الأميليز
		إنزيم السكريز

سؤال : أكمل الفراغات التالية :

- الكاشف العام على البروتينات هو اختبار
- نستنتج من النتائج السابقة أن الإنزيمات عبارة عن مواد ، لأنها أعطت نتيجة مع اختبار البيوريت .
- جميع الإنزيمات عبارة عن ، بينما ليس جميع البروتينات

٦.١. مقدمة:

الكربوهيدرات هي مركبات عضوية الدهنية أو كيتونية متعددة الهيدروكسيل أو التي تعطي عند تحللها مائياً ألدهيدات أو كيتونات عديدة الهيدروكسيل.

صيغتها الجزيئية هي $(\text{CH}_2\text{O})_n$ وهي تتكون من عناصر O,C,H وبعضها يحتوي على N,P,S

٦.٢. وظيفة الكربوهيدرات:

- ١- مخزن كبير للطاقة الكيميائية.
- ٢- مصدر للكربون في عملية تكوين المكونات الخلوية.
- ٣- لها وظائف بيولوجية أخرى مهمة داخل الخلية.

٦.٣. تصنيف الكربوهيدرات :

- (١) سكريات أحادية: هي أبسط أنواع الكربوهيدرات وهي الوحدات البنيّة للسكريات الثنائيّة والمعديّة، يرمز لها بالصيغة الجزيئية $\text{C}_n(\text{H}_2\text{O})_n$ وتصنف إلى قسمين منها سكريات الدهنية مثل الجلوكوز - سكريات الكيتونية مثل الفركتوز.
- (٢) سكريات ثنائية: هي ناتجة عن اتحاد جزئين من السكريات الأحادية السادسية، وأهمها السكروز والمالتوز واللاكتوز.
- (٣) السكريات المتعددة: تشمل السكريات التي تنشأ من اتحاد (١٠-٣) وحدات من السكريات الأحادية
- (٤) السكريات العديدة: وهي ناتجة من اتحاد عدد كبير من الجزيئات السكريات الأحادية يربط بينها روابط جلايكوزيدية

٤.٦. الاختبارات العامة للكربوهيدرات:

١- اختبارات وصفية للكربوهيدرات

الهدف من الاختبارات:

- ١- التعرف على الكربوهيدرات كمواد مختلفة عن اللبيدات والبروتين.
- ٢- التمييز بين السكريات المختزلة وغير المختزلة.
- ٣- التمييز بين السكريات الأحادية والثنائية والعديدة.
- ٤- التمييز بين السكر الألذوي والسكر الكيتوzi.
- ٥- التمييز بين السكريات الأحادية الخامسة (البنتوزات) والسكريات الأحادية السادسة (الهكسوزات).

٤.٦.١. اختبار الذوبانية

تذوب السكريات الأحادية و الثانية في المحاليل المائية نظراً لاحتوائهما مجموعات قطبية مثل الهيدروكسيل التي تستطيع تكوين روابط هيدروجينية مع الماء بينما السكريات العديدة فهي إما ضئيلة أو عديمة الذوبان وذلك بسبب كبر وزنها الجزيئي و طول السلسل المكونة لها و درجة تفرعها.

يمكنا من خلال التجربة التمييز بين السكريات الأحادية و الثانية من جهة و السكريات العديدة من جهة أخرى.

النظرية العلمية للاختبار

السكريات الأحادية و الثانية قابلة للذوبان في الماء أما السكريات العديدة فنظراً لكبر جزيئاتها فإنها شحيدة الذوبان أو عديمة الذوبان في الماء وإذا ذابت فإنها تكون محليل غروية وتظهر معكراً نوعاً ما.

الأدوات و المواد:

- محليل مواد سكرية أحادية (جلوكوز- فركتوز- الرابيوز)
- محليل مواد سكرية الثنائية (سكروز- لاكتوز- المالتوز)
- محليل مواد سكرية متعددة (النشا)
- أنابيب - ماسك - ماصة.
- حمام مائي

طريقة العمل:

اخبرن ذوبانية كل مادة على حدة وذلك برج كمية قليلة من المادة مع الماء البارد أولأ ثم مع الماء الساخن.
دون ملاحظاتك في الجدول التالي وقارن بين درجة ذوبانية المواد في الماء البارد والساخن.

النتائج:

الأنبوبة	إذابة في ماء بارد	إذابة في ماء ساخن
جلوكوز		
فركتوز		
رافيوز		
سكروز		
مالتوز		
لاكتوز		
نشا		
سكرنيات عديدة		

مناقشة النتائج:

الأسئلة:

لماذا تكون السكريات العديدة محاليل غروية؟




٤.٦.٢ اختبار موليش

يعتبر اختبار مميز للكربوهيدرات لتمييزها عن البيريدات والبروتين (اختبار عام لجميع الكربوهيدرات). يعطي هذا الاختبار نتيجة إيجابية عبارة عن لون بنفسجي مع جميع الكربوهيدرات.

النظريّة العلمية للاختبار

عند إضافة أحماض مرکزة على السكريات يتم نزع ٣ جزيئات ماء من ثلاثة مجموعات هيدروكسيل من السكر ويكون مركب الدهيدي حلقى تتفاعل مجموعة الألدهيد فيه مع الكثير من المركبات العطرية كمركب ألفا-نافتول الكحولي فتنتج مركبات ملونة تستخدم للتعرف على وجود السكريات وتقديرها كمياً.

ينتج الفورفورال من السكر الخماسي وهيدروكسي ميثيل فورفورال من السكر السادس ويمكن لكل منها أن يتفاعل مع الفاناـنـافـول حيث يتكون مركب أحمر بنفسجي بظاهر حلقة بين سطحي الانفصـالـ.

**الأدوات و المواد:**

- ٧ حمض الكبريتيك المرکز
- ٨ محلول ٥٪ الفاناـنـافـول (٥٥ جم/لتر مذاباً في الكحول (إيثانول) (حديث التحضير)
- ٩ محلائل بعض الكربوهيدرات.

١٠ ماصة

١١ أنابيب اختبار

١٢ ماسك أنابيب

طريقة العمل:

١. ضع في أنبوبة الاختبار ٢ مل محلول السكر

٢. اضف ٥ نقاط من محلول ٥ % ألفا-نافتول

٣. أضيف باحتراس وببطء ٢ مل من حمض الكبريتيك المركز على جانب الأنبوبة

ثم بحيث تكون طبقتان. يشغل حمض الكبريتيك الطبقة السفلية للخيط الموجود بالإأنبوبة و تكون حلقة بنفسجية اللون عند الجدار الفاصل بين الطبقة الحمضية و الطبقة السكرية تنتشر هذه الطبقة عند رج الأنبوبة لينلون الخيط كله باللون البنفسجي. تعتمد درجة اللون على التركيز المادة السكرية المختبرة.

النتائج:

الإستنتاج	الملاحظة	الأنبوبة	النتائج
		جلوكوز	ناتئ إيجابي
		فركتوز	ناتئ سلبي
		راغيوز	ناتئ سلبي
		سكروز	ناتئ سلبي
		مالتوز	ناتئ سلبي
		لاكتوز	ناتئ سلبي
		نشا	ناتئ سلبي
		سكريات عديدة	ناتئ سلبي

مناقشة النتائج:

الأسئلة:

لماذا تعطي جميع السكريات نتيجة ايجابية مع اختبار موليشر؟

.....

.....

.....

.....

6.4.3 الاختبارات اختزالية


تقسم السكريات الى سكريات مختزلة او غير مختزلة، فاذا وجدت مجموعة كربونيل حرة سميت بالسكريات المختزلة اما اذا ارتبطت تلك المجموعة بمادة أخرى و أصبحت غير حرة (مثل السكروز) فقدت صفاتها الإختزالية.
وتتضمن اختبار بندكت و اختبار بارفويد

6.4.3.1 اختبار بندكت:

التمييز بين السكريات المختزلة (الجلوكوز- الفركتوز- المالتوز-اللاكتوز -الريبيوز -الارابينوز) وغير المختزلة (السكروز).

نظريّة العلميّة الاختبار:

يتكون محلول بندكت من كبريتات النحاس وقلوي ضعيف هو كربونات الصوديوم حيث يتكون راسب ازرق من هيدروكسيد النحاس، لذلك يضاف محلول سترات الصوديوم التي تذيب الراسب ويتكون محلول رائق هو مترافق سترات النحاس الثنائي. ويختزل هذا المترافق في وجود سكر مختزل إلى أكسيد النحاس الأحمر حيث يظهر بشكل راسب أحمر أو برتقالي. والسكريات المختزلة هي تلك التي تحتوي على مجموعة كربونيل حرة (الالدهيد CHO أو الكيتون C=O) وتوجد هاتان المجموعتان في الصيغ ذات السلسلة المفتوحة أما في الصيغ الحلقي فإن هذه المجموعات المختزلة تظهر بتحول التركيب الحلقي إلى التركيب ذات السلسلة المفتوحة أثناء التفاعل.



الأدوات و المواد:

- محليل سكرية مختلفة (١ جرام %)
- محلول بندكت (كبريتات نحاس + بيكربونات صوديوم+ سترات صوديوم)
- حمام مائي مغلي.
- أنابيب اختبار و ماسك.
- ماصة.

طريقة العمل:

١. ضع في ٢ مل من كاشف بندكت انبوبة الاختبار
٢. أضف لكل انبوبة ١ مل من محلول السكر ورج المزيج
٣. نضعها في حمام مائي مغلي لمدة ٧ دقائق
٤. أترك الأنبوة لتبرد بيضاء (تجنب التبريد بماء الصنبور). لا حظ تكون راسب أحمر أو برتقالي أو أخضر وذلك حسب كمية السكر المختزل. في غياب السكريات المختزلة يتكون لون أسود من أكسيد الحديديك.

النتائج:

الاستنتاج	الملاحظة	الأنبوبة
		جلوكوز
		فركتوز
		مالتوز
		سكروز
		النشا

مناقشة النتائج:

الأسئلة:

اي من السكريات تخترل محلول بندكت ؟ ولماذا ؟ اذكر مثال علي ذلك؟

اي من السكريات لا تخترل محلول بندكت ؟ ولماذا ؟ اذكر مثال علي ذلك؟

بالرغم من أن السكرоз والمالتوز كلاً منهما سكر ثانوي إلا أن أحدهما مخترل والأخر غير مخترل. كيف تفسر ذلك؟

6.4.3.2 اختبار بارفوايد:

اختبار يميز السكريات الأحادية مختزل (الجلوكوز- الفركتوز- الارابينوز- الريبيوز) وسكريات الثنائيه المختزله (المالتوز- اللاكتوز).

النظيرية العلمية للاختبار:

في هذا الاختبار يتم الاختزال في وسط حمضي بدلاً من الوسط القلوي كما هو الحال في اختبار بندكت واختبار حمض البكريك. وفي هذه الظروف تستجيب السكريات الأحادية المختزلة للاختبار أسرع من السكريات الثنائية المختزلة حيث تتفاعل السكريات الثنائية المختزلة ببطء. ويكون كاشف بارفوايد من محلول خلات النحاس في حمض الخليك. لكن يلاحظ انه عند زيادة التسخين فوق خمس دقائق فان السكريات الثنائية سوف تتحلل بفعل الحرارة الى سكريات احادية وبذلك تعطى نفس النتيجة.

الأدوات والمواد:

- محاليل سكرية.
- كاشف بارفوايد (يداب ١٣.٣ جم من خلات النحاس في ٢٠٠ مل ماء ثم يضاف ٨.١ من حمض الخليك).
- حمام مائي مغلي
- أنابيب اختبار و ماسك
- ماصة

طريقة العمل:

١. أضف حوالي ١مل من محلول السكر
 ٢. إلى حوالي ٢مل من كاشف بارفوايد
 ٣. سخن لدرجة الغليان مدة ١٠ دقائق واترك محلول ليبرد.
- لاحظ تكون لون أحمر طوي في وجود السكر المختزل.

النتائج:

الإستنتاج	الملاحظة	الأنبوبة
		جلوكوز
		فركتوز
		مالتوز
		سكروز
		النشا

مناقشة النتائج:

الأسئلة:

لماذا يجب عدم ترك الأنابيب تغلي لمدة تتجاوز خمس دقائق؟

ما واجه الاختلاف بين اختبار بندكت و اختبار بارفويدي؟


6.4.3.3 اختبار بايل:

يستخدم هذا الإختبار التمييز بين السكريات الأحادية الخامسة (البنتوزات مثل الارابينوز والريبيوز) والسكريات الأحادية السادسة (الهكسوزات مثل الجلوكوز والفركتوز).

النظرية العلمية للاختبار:

إذا سخن محلول البنتوز مع حمض الهيدروكلوريك المركز لمدة قصيرة يتكون الفورفورال وهذا يتفاعل مع الاورسينول في وجود أيونات الحديديك حيث يتكون لون أخضر مزرق.

يلاحظ أن النسخين لمدة طويلة قد يتحول الهكسوز إلى هيدروكسي ميثيل فورفورال الذي يتفاعل مع الاورسينول.

**الأدوات والمواد:**

- كاشف الاورسينول (يذاب ١.٥ جم من الاورسينول في ٥٠٠ مل من حمض الهيدروكلوريك المركز ثم يضاف ٢٠ قطرة من محلول ١٠٪ كلوريد الحديد)
- مواد سكرية.
- أنابيب اختبار مع ماسك
- حمام مائي مغلي
- ماصة

طريقة العمل:

١. أضف حوالي ١ مل من محلول السكر
٢. ٥ مل من كاشف الاورسينول في أنبوبة اختبار
٣. سخن لمدة ٧ دقائق في حمام مائي مغلي . إذا تكون لون أخضر مزرق فإن الكشف موجب.

النتائج:

الإستنتاج	الملاحظة	الأنبوبة
		ريبيوز

		جلوكوز
		فركتوز

مناقشة النتائج:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

الأسئلة:

ما هي السكريات التي تتفاعل مع كاشف بايل؟

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ما هو المركب الذي يتكون خلال التفاعل والذي بدوره يتفاعل مع كاشف بايل؟

.....


.....

.....

.....

6.4.3.4 اختبار سلفانوف:

يستخدم هذا الإختبار للتمييز بين السكريات الأحادية الالدهيدية (الجلوكوز) والسكريات الأحادية الكيتونية (الفركتوز) أو على السكريات التي تعطي سكريات كيتونية بالتحلل المائي مثل السكروز.

**النظرية العلمية للاختبار:**

تختلف السكريات الكيتونية عن السكريات الالدهيدية في أنها تفقد الماء وتكون فورفورال بسهولة أكثر. و يتكتف الفورفورال مع الريزوسينول بتكون مترافق أحمر اللون. وعلى ذلك يجب ألا يسخن محلول لمدة طويلة وإنما السكريات الالدهيدية تعطي اختباراً موجباً أيضاً.

المواد والأدوات:

- كاشف سلفانوف (٥.٠ جم ريزوسينول/لتر من حمض الهيدروكلوريك-٣ عياري)
- محليل سكرية
- حمام مائي مغلي
- أنابيب و ماسك
- ماصة.

طريقة العمل:

١. أضف قطرتين من محلول السكر
٢. أضف إليها ٢ مل من الكاشف سلفانوف
٣. ضع محلول في حمام مائي مغلي لمدة ٢٠ دقيقة.
٤. لاحظ تكون لون أحمر داكن مع السكريات السادسية الكيتونية بينما السكريات السادسية الالدهيدية تعطي لون أحمر قرمزي فاتح ببطء.

النتائج:

الاستنتاج	الملاحظة	الأنبوبة
		جلوكوز
		فركتوز

مناقشة النتائج:

الأسئلة:

ما هي السكريات التي تعطي نتيجة مع كاشف سلفانوف؟


7. الكربوهيدرات (٢)

هناك نوعان من الكربوهيدرات:

١. كربوهيدرات بسيطة: تتكون من السكريات الأحادية فقط
٢. الكربوهيدرات المعقّدة: تتكون من جزء سكري وجزء آخر غير سكري مثل البروتينات أو الدهون وتسمى جلايكوبروتين أو جلايكوليب.

7.1. التركيب الحلقي للسكريات الأحادية

أثبتت الدراسات أن السكريات توجد في الصورة الحلقية وتسمى الهيماستيل الحلقي وأن السلسلة المفتوحة تعد ذات نسبة ضئيلة جداً في محلول الشكل الحلقي ينتج عنه متانترة بناء على ذرة الكربون رقم ١ في الجلوكوز الحلقي ، فإذا كانت مجموعة الهيدروكسيل إلى أسفل أو اليمين يطلق على المتناظر ألفا (α) والعكس إذا اتجهت إلى أعلى أو اليسار يطلق عليه بيتا (β) .



7.2. الكربوهيدرات عديدة التسکر :

هي كربوهيدرات ينتج من تحللها المائي عدد كبير من السكريات الأحادية و ت تكون هذه السكريات من سلسلة طويلة جداً متفرعة او مستقيمة مرتبطة بواسطة روابط جليكوزيدية وقد تكون متجانسة أي أنها تحتوي على نوع واحد من السكريات الأحادية كالنشا أو السيلولوز ، أو تكون غير متجانسة أي أنها تحتوي على أكثر من نوع من السكريات الأحادية كالهيبارين . و تتحلل السكريات العديدة عموماً وكذلك المتعددة و الثنائية بواسطة الأحماض القوية أو الإنزيمات التي تحلل تلك الروابط إلى مكوناتها الأحادية.

7.3 الإختبارات العملية للسكريات العديدة والثانية

7.3.1 كشف اليود:

يستخدم هذا الإختبار للتمييز بين السكريات العديدة (النشا- الجليكوجين- الديكسترين- الانولين) والسكريات الأخرى (الأحادية والثنائية). حيث تعطي بعض السكريات العديدة مثل النشا (أميلوز و أميلوبكتين) و الجليكوجين و الديكسترين لوانا مميزة عند إضافة اليود إليها.

النظرية العلمية للاختبار:

يكون محلول اليود متراكبات إنزازية مع السكريات العديدة فيعطي النشا لون أزرق و السبب في ذلك أن جزئ الاميلوز يوجد على هيئة سلسلة حلزونية الشكل هذا اللون يزول بالتدفئة ويعود بالتبريد مرة أخرى و الأميلوبكتين يكون لونا بنفسجي مع اليود. ويعطي الجليكوجين لون بنيا مع اليود ويعطي الديكسترين مع اليود لوانا تدرج من البنفسجي الفاتح إلى البني إلى الأصفر تبعاً لعدد وحدات الجلوكوز بجزئ الديكسترين، ولا يعطي الانولين أي لون مع اليود. ولا تعطي السكريات الأحادية أو الثنائية نتائج إيجابية مع هذا الإختبار.

المواد والأدوات:

- محلول اليود (أذب ٦.٠ جم من اليود في ٥٠٠ مل من محلول يوديد البوتاسيوم ٣٪)
- محاليل سكريات عديدة النشا- الجليكوجين- الديكسترين- الانولين
- محاليل سكريات أحادية وثنائية (جلوكوز وسكرور)
- حمض الهيدروكلوريك المخفف.
- حمام مائي.
- أنابيب اختبار و ماسك
- ماصة

طريقة العمل:

١. اضف ٢ مل من محلول الكربوهيدرات
٢. اضف ٠.٥ مل من محلول اليود
٣. أضف قطرة من حمض الهيدروكلوريك المخفف
٤. رج جيداً نلاحظ اللون المتكون بعد ذلك سخن الأنبوة و لاحظ اللون ثم برد الأنبوة و لاحظ اللون مرة أخرى.

النتائج:

الاستنتاج	الملاحظة	الأتبوبة
		النشا
		الجيوكجين
		الدكسترين
		الإينولين
		الجلوكوز
		السكروز

مناقشة النتائج:

الأسئلة:

أحد السكريات العديده لا يعطي نتيجة مع اليود ما هو؟


لماذا يعطي النشا والجيوكجين نتيجة إيجابية بينما لا يعطي الجلوکوز ولا السکروز نفس النتيجة؟

7.3.2. التحلل المائي للسكروز:

السكروز سكر ثانٍ يتكون من ارتباط جزئي من الجلوكوز مع جزئ من الفركتوز في الموقعين ٢،١ على الترتيب لذا لا توجد مجموعات مختزلة في السكرورز. فعند تحلله مائياً يعطي السكريين المختزلين الجلوكوز والفركتوز فيكتسب خواصاً إختزالية.

النظرية العلمية لاختبار:

السكروز سكر ثانٍ يتكون من ارتباط جزئي من الجلوكوز مع جزئ من الفركتوز في الموقعين ٢،١ على الترتيب ولذا لا توجد مجموعات مختزلة في السكرورز فلا يؤثر على كاشف بندكت أو على حمض البكريك أو كاشف بارفوييد كما أنه لا يكون أوزازون إلا بعد أن يتحلل السكرورز إلى مكوناته.



المواد والأدوات:

- محلول سكرورز (١ جم/لتر)
- حمض الهيدروكلوريك المركز.
- محلول هيدروكسيد الصوديوم (٥ عياري).
- كاشف بندكت.
- أنابيب اختبار و ماسك.
- حمام مائي مغلي.
- ماصه.

طريقة العمل:

١. أضف ٥ قطرات من حمض الهيدروكلوريك المركز إلى ٥ مل من محلول السكرورز في أنبوبة اختبار.
٢. سخن لمدة ٥ دقائق في حمام مائي مغلي. أترك الأنابيب لتبرد أو ضعها تحت صنبور الماء
٣. أضف محلول هيدروكسيد الصوديوم قطرة قطرة حتى تحصل على محلول متوازن أو قلوي قليلاً. (يتم الكشف بواسطة ورق تباع الشمس)
٤. اكتشف عن الجلوكوز والفركتوز في محلول الناتج وذلك بإجراء اختبار بندكت للكشف عن الجلوكوز ثم اكتشف عن الفركتوز بكاشف سلفانوف.

النتائج:

الاستنتاج	النتيجة	الأنبوبة

مناقشة النتائج:

.....

.....

.....

.....

الأسئلة:

ما يتكون السكروز؟

.....

.....

.....

عل السكروز سكر غير مخترل؟

.....

.....

.....

.....

7.3.3 التحلل المائي للنشا:

سيستخدم هذا الإختبار للتعرف على طبيعة السكر الأحادي المكون لجزئ النشا وذلك بالتحلل المائي في وسط حمضي حيث يتكون الجلوكوز الذي يمكن الكشف عنه.

النظرية العلمية للاختبار:

لا يحتوي جزئ النشا العملاق إلا على عدد محدد جداً من المجموعات المختزلة ولذا فهو أساساً لا يختزل محلول بندكت ولا حمض البكريك ولا كاشف بارفويد. أما بعد التحلل المائي فيتكون الجلوكوز وهو سكر مختزل ويكون اوزازون.

المواد والأدوات:

- محلول النشا (%) ١١
- حمض الهيدروكلوريك المركز
- محلول هيدروكسيد الصوديوم (٥ عياري)
- محلول اليود.
- كاشف بندكت
- هيدروكسيد الصوديوم ١٠٪
- أنابيب اختبار نظيفة.
- حمام مائي.
- ماصة.

طريقة العمل:

١. ضع ٢ مل من النشا في أنبوبة اختبار كبيرة
٢. أضف ٥ نقاط من حمض الهيدروكلوريك المركز، وسخنها في حمام مائي يغلي لمدة ١٥ دقيقة، ثم برد محلول.
٣. أضف كمية من هيدروكسيد الصوديوم إلى أن يصبح الوسط قاعديا
٤. قسم محتوى الأنبوبة إلى أنبوبتين نظيفتين بالتساوي
٥. أضف لإحدى الأنبوبتين ١ مل من محلول اليود ونلاحظ النتيجة.
٦. أضف للأنبوبة الثانية ١ مل من كاشف بندكت ثم رج و سخن لمدة ٣ دقائق ونلاحظ النتيجة

النتائج:

الاستنتاج	النتيجة	الأنبوبة

مناقشة النتائج:

.....

.....

.....

.....

الأسئلة:

ماذا ينتج من تحلل النشا؟ وكيف يمكن الكشف عنه؟

.....

.....

.....

.....


.....

(Lipids) 8. الدهون

توجد الدهون طبيعياً في الكائنات الحية ولها وظائف تركيبية في الخلية حيث تدخل في تركيب الغشاء الخلوي. وتعتبر الدهون مصدراً أساسياً من مصادر الطاقة في الجسم تفوق كل من الكربوهيدرات والبروتينات. ويمكن تعريفها بأنها مركبة عضوية غير قطبية عديمة الذوبان في الماء ولكنها تذوب في المذيبات العضوية مثل البنزين والأثير والكلوروفورم وغيرها.

8.1. الأحماض الدهنية (fatty acids)

هي الوحدات البنائية للدهون، وهي عبارة عن سلسلة هيدروكربونية (hydrocarbon chain) طويلة تحتوي في طرفها على مجموعة كربوكسيل (carboxyl group) وتنقسم الأحماض الدهنية إلى: أحماض دهنية مشبعة (saturated) وأحماض دهنية غير مشبعة (unsaturated) تحتوي على روابط مزدوجة (double bonds).




يمكن تقسيم الليبيادات حسب تركيبها الكيميائي إلى:

أليبيادات بسيطة (Simple lipids)

وهي إسترات الأحماض الدهنية مع الكحول مثل الجليسرول، ومن أمثلتها الدهون والزيوت (fats and oils). ويعتبر ثلاثي اسمايل الجليسرول triacylglycerol من أبسط وأكثر الدهون انتشاراً وهي الصورة التي تخزن عليها الدهون ومخزن الطاقة داخل الخلية.

الصيغة العامة لليبيادات والزيوت



بـ-ليبيادات المركبة (conjugated lipids): وهي دهون تربط مع مركبات أخرى مثل الفوسفوليبيد (phospholipids) والجلايكوليبيد (glycolipids).

جـ-ليبيادات المشتقة (derived lipids): وهي مواد توجد ذاتية في الدهون وبالرغم من أن العديد منها ليست إسترات ولكن حيث إنها توجد ذاتية في الدهون أو اشتقت من تحلل الدهون مائيًا فتعتبر جوازًا أنها دهون مشتقة ومن أمثلتها الكوليسترول.

٨.٢ الاختبارات الوصفية للدهون (Qualitative tests of lipids)

٨.٢.١ اختبار الذوبانية (Solubility test)

هدف التجربة:

إثبات أن الزيوت والدهون هي مركبات تختلف في ذوبانها عن الكربوهيدرات والبروتينات نظراً لاختلاف تركيبها الكاره للماء.

النظريّة العلميّة للإختبار :

لا تذوب الزيوت أو الدهون في الماء نظراً لطبيعتها الغير قطبية (الهييدروفوبية) ولكنها تذوب في المذيبات العضوية كالإيثر والبنزرين والكلوروفورم والكحول المغلي وغيرها.

تحتفل الدهون فيما بينها في قابليتها للذوبان في المذيبات العضوية المختلفة ويستفاد من ذلك في فصل خليط من الدهون عن بعضها البعض وعلى سبيل المثال لا تذوب الفوسفاتيدات (phosphatide) في الأسيتون ولا تذوب السيريبوروسيد (cerebroside) وكذلك السفنجوماليين (Sphingomyline) المختلفة في الإيثر.

المواد والأدوات المطلوبة:

- زيت الزيتون (أو زيت بذرة القطن)-زبد- زيت الذرة
- المذيبات: حمض مخفف-قلوي مخفف-إيثanol-أيثر-كلوروفورم - أسيتون
- أنابيب اختبار
- حمام مائي
- حامل أنابيب

طريقة العمل:

- ١- ضع 0.5ml من الزيت في 6 أنابيب اختبار نظيفة جافه.
- ٢- أضف كل أنبوبة على أحد المذيبات (الأسيتون و الكلوروفورم و الإيثر و الإيثانول البارد والماء).
- ٣- رج الأنابيب جيداً ، ثم اترك المحاليل لمدة حوالي دقيقة واحدة،
- ٤- لاحظ النتائج فإذا انفصلت إلى طبقتين يكون الزيت غير ذائب وإنما إذا تكونت طبقة واحدة متجانسة شفافة يكون الزيت ذائباً في المذيب.
- ٥- دون النتائج في الجدول

النتائج :

مدى الذوبانية	المذيب	البييد
	الأسيتون	-١
	الكلوروفورم	-٢
	الإيثر	-٣
	الإيثانول البارد	-٤
	الماء	-٥
		-٦

مناقشة النتائج:

الأسئلة:

أي المذيبات يعتبر أفضل المذيبات للبييدات ؟

أي المذيبات يعتبر أسوأ المذيبات للبييدات ؟

ما أنواع الأحماض الدهنية الموجودة في الأغذية الشائعة الإستخدام مثل:

زيت دوار الشمس

زيت الزيتون

زيت الذرة


الزبدة

شمع النحل

8.2.2 اختبار الاكرولين (Acrolein test) :
يستخدم هذا الإختبار للكشف عن وجود الليبيدات حيث تعطي رائحة مميزة من الأكرولين

النظرية العلمية للإختبار :

تعمل بيكريلات البوتاسيوم KHSO_4 (الصلبة) على نزع جزيئين ماء (dehydration) من كل جزء جليسروول بالزبوت أو الدهون حيث يتحول الجليسروول إلى اكرولين acrolein والذي يمكن تمييزه من رائحته النفاذة المهيجة للأغشية.



ويمكن الكشف عن وجود الدهون بواسطة صبغة Sudan IV (صبغة عامه للدهون)، حيث تصبغ الدهون عند إضافتها بصبغة حمراء.

الأسئلة :

لماذا يستخدم اختبار الاكرولين كاختبار عام للزبوت والدهون ؟

هل تتوقع أن تحصل على نتيجة إيجابية فيما لو استخدمت مایلي مع توضيح السبب:

(أ) حمض الأوليك أو حمض البالمتيك


(ب) شمع النحل

٨.٢.٣ اختبار التصبن : (Saponification test)

يهدف هذا الإختبار إلى عرفة التركيب الكيميائي للصابون و عمله كمنظف ومزيل لزيوت والأترية.

النظرية العلمية للاختبار:

التصبن عبارة عن عملية تحليل الزيوت أو الدهن مائيا في وسط قلوي وينتج عن ذلك جليسروول وأملاح الأحماض الدهنية (الصابون Soap) ويمكن استخدام عملية التصبن في فصل المواد القابلة للتصبن عن المواد الغير قابلة للتصبن (التي توجد ذاتية في الدهون) ويمكن توضيح عملية التصبن كما يلي :



يمكن تعريف الصابون على انه الأملاح المعدنية للأحماض الدهنية.
والصابون قابل للذوبان في الماء ولكنه غير قابل للذوبان في الايثر. ويعمل الصابون على استحلاب الزيوت والدهون في الماء حيث أنه يعمل على تقليل الجذب السطحي للمحلول .

المواد والأدوات المطلوبة:

- أنواع من الزيوت مثل زيت الذرة، زبد، زيت الزيتون .
- محلول KOH في الكحول (20% KOH)
- حمام مائي(درجة الغليان)

طريقة العمل:

- ضع ٢ مل من الزيت في أنبوبة اختبار كبيرة (أو دورق) .
- أضف ٤ مل من هيدروكسيد البوتاسيوم الكحولي (يفضل إضافة قليلاً من قطع الخزف الصغيرة لتنظيم الغليان).
- اغلي المحلول لمدة ٣ دقائق. بعد مضي هذه المدة تأكيد من تمام عملية التصبن، وذلك بأخذ قطرة من المحلول ووضعها في الماء فإذا انفصل الزيت دل ذلك على عدم استكمال عملية التصبن. وفي هذه الحالة استمر في الغليان حتى يتbxر جميع الكحول.
- خذ المادة الصلبة المتبقية (الصابون) وأنبهها في حوالي ٣٠ مل من الماء وأحتفظ بها للاختبارات التالية.
- رج المحلول بعد أن يبرد ولاحظ تكون رغوة كثيفة

النتائج:

الاستنتاج	المشاهدة	الأنبوبة

الأسئلة:

ما هو التركيب الكيميائي للصابون؟

ما فائدة إضافة هيدروكسيد البوتاسيوم في هذا الاختبار؟

اذكر أهم النواتج لعملية التصبن؟

فيما لو استخدمت زبدة الكاكاو فما نوع الصابون الذي سوف تحصل عليه؟

فيما لو استخدمت أحماض دهنية بدلاً من الزيت فهل تتوقع أن تحصل على الصابون؟

٤.٢.٤ اختبار فصل الصابون من محلول التمليس : (salting out of soap)

يمكن الحصول على الصابون من محلوله وذلك بعملية التمليس (salting out) فعند إضافة كلوريد الصوديوم الصلب إلى محلول الصابون حتى التشبّع ينفصل الصابون على صورة غير ذائبة ويطفو فوق السطح.

المواد والأدوات المطلوبة:

- الصابون (الذي تم تحضيره في التجربة السابقة)

- ملح كلوريد الصوديوم الصلب NaCl

- كاس زجاجي صغير

طريقة العمل:

ضع حوالي ١٠ مل من الصابون في كاس، ثم أضف كميات قليلة من كلوريد الصوديوم على دفعات مع التقليب حتى يتسع محلول.

النتائج:

الاستنتاج	المشاهدة

مناقشة النتائج:

.....

.....

.....

الأسئلة:

ما سبب انفصال طبقة الصابون على السطح عند إضافة الملح؟

.....


.....

.....

.....

٨.٢.٥ اختبار تحضير الأحماض الدهنية من الصابون : (Formation of fatty acids)

يلاحظ أن إضافة حمض مثل حمض الهيدروكلوريك إلى الصابون (الأملاح المعدنية للأحماض الدهنية) يعمل على تحلل الجليسيريدات إلى الأحماض الدهنية على صورة حرة غير ذائبة في الماء.

**المواد والأدوات المطلوبة:**

- الصابون (الذي تم تحضيره في التجربة السابقة)

- حمض الهيدروكلوريك HCl % ١٠

- حمام ثلجي

طريقة العمل:

ضع حوالي ٥ مل من الصابون في أنبوبة اختبار، ثم ضع الأنبوبة في حمام ثلجي، ثم أضف إليها حمض الهيدروكلوريك نقطة نقطة (والأنبوبة في الحمام الثلجي) حتى تتكون طبقة زيتية طافية على السطح.

النتائج:

الاستنتاج	المشاهدة	الأنبوبة

الأسئلة:

ما هو التركيب الكيميائي لطبقة الزيتية الطافية؟

اكتب معادلة حمض الهيدروكلوريك مع الصابون؟

8.2.6 اختبار تكوين أملاح الأحماض الدهنية الغير ذاتية (Insoluble soaps) :**النظريّة العلميّة للاختبار:**

تعمل أيونات الكالسيوم أو المغنيسيوم أو الرصاص على ترسيب الصابون وتجعله غير ذائب في الماء حيث تحل هذه الايونات محل أيونات الصوديوم أو البوتاسيوم الموجوده في الصابون . ونظراً لاحتواء الماء العسر على كميات ملحوظة من Ca^{++} , Mg^{++} وبعض Fe^{+++} فيصعب تكون الرغوة .

صابون البوتاسيوم + كبريتات الكالسيوم = صابون الكالسيوم + كبريتات البوتاسيوم.

(يتكون راسب أبيض من استيارات أو أوليات الكالسيوم).

المواد والأدوات المطلوبة:

- الصابون (الذي تم تحضيره في التجربة السابقة)

- كلوريد الكالسيوم $\text{CaCl}_2 \text{ \% } ۵$ - كلوريد أو كبريتات المغنيسيوم $\text{MgCl}_2 \text{ \% } ۵$

- اسيتات الرصاص Lead acetate

- أنابيب اختبار نظيفة وجافة

طريقة العمل:

- ١- اضف حوالي ٤ مل من الماء المقطر الى ٢ مل من الصابون في ثلاثة أنابيب اختبار
- ٢- اضف لاحد الأنابيب بضع قطرات من كلوريد الكالسيوم وللنبوة الثانية كلوريد المغنيسيوم، وللنبوة الثالثة خلات الرصاص.

النتائج:

النبوة	النتيجة	الاستنتاج
١		
٢		
٣		

مناقشة النتائج:

.....

.....

.....

الأسئلة :

اكتب معادلة تفاعل كلوريد الكالسيوم مع الصابون؟

.....

.....

.....

ماذا يحدث للصابون عند الغسيل بالماء العسر؟

.....

.....

.....

8.2.7 اختبار خلات النحاس:

يستخدم هذا الإختبار للتمييز بين الزيت أو الدهن المتعادل و الحمض الدهني المشبع والحمض الدهني غير المشبع.

النظرية العلمية للاختبار:

لا تتفاعل الزيوت أو الدهون مع محلول خلات النحاس أما الأحماض الدهنية المشبعة والغير مشبعة فتنتقل مع خلات النحاس مكوناً الملح النحاسي المتكون في حالة الأحماض الدهنية الغير مشبعة فقط يمكن استخلاصه بواسطة الإيثر البترولي.

المواد:

زيت الزيتون- حمض الأوليك (حمض دهني غير مشبع)- حمض الاستيارك (حمض دهني مشبع)-إيثر بترولي- محلول خلات النحاس (%)^٥.

طريقة العمل:

- ١- خذ ثلاثة أنابيب اختبار وضع ١/٢ جم من كل مادة.
- ٢- أضيف ٣ مل من الإيثر البترولي وحجم مساوي له من محلول خلات النحاس.
- ٣- رج الأنابيب واتركها بعض الوقت.

في حالة زيت الزيتون يلاحظ أن طبقة الإيثر البترولي العليا تحتوي على الزيت مذاباً فيها ويظهر عديم اللون ويبقى محلول المائي السفلي أزرق اللون.

وفي حالة حمض الأوليك تتلون طبقة الإيثر البترولي العليا بلون أخضر نتيجة لذوبان أوليفيات النحاس فيها أما الطبقة السفلية فتظل زرقاء.

وفي حالة حمض الاستيارك يلاحظ أن طبقة الإيثر البترولي العليا تبقى عديمة اللون بينما يتكون راسب أخضر باهت من ستيارات النحاس في الطبقة السفلية.

النتائج:

الاستنتاج	المشاهدة	الاتبوبة

مناقشة النتائج:

الأسئلة:

لماذا لا يتكون راسب أو لون أخضر مع زيت الزيتون في هذه التجربة؟

ماذا تتوقع أن تكون النتيجة فيما لو استخدمت حمض البالمتيك أو اللينولييك؟

8.2.8 اختبار عدم التشبع (اختبار اليود):

تستخدم هذه التجربة للتعرف على طبيعة الأحماض الدهنية في الزيت أو الدهن هل هي من النوع المشبع أو غير المشبع.

النظريّة العلميّة لِلإختبار :

ينتقل اليود (بني اللون) مع المركبات غير المشبعة وذلك بالإضافة على جانبي الرابطة المزدوجة وبذلك يتغير لون اليود.

المواد والأدوات:

زيت الزيتون، حمض الأوليفيك، زبد ، حمض الاستيارك (مذابة في الكلوروفورم).

محلول اليود في الكحول

أنابيب إختبار

طريقة العمل:

أضف إلى حوالي ٢ مل من كل من المحاليل السابقة ثلاثة قطرات من محلول اليود. لاحظ ما يحدث وفسر مشاهدتك.

النتائج:

الاستنتاج	المشاهدة	الأنبوبة

٩. تقدير سكر الجلوكوز في الدم

يعتبر الجلوكوز (سكر الدم) من أكثر الفحوصات المخبرية أهمية ويعتبر أحدى الوسائل التشخيصية وخاصة لمرض السكري.

الجلوكوز أهم المواد السكرية في الجسم حيث يمكن للجسم الحصول عليه من عمليات الهضم للكربوهيدرات أو من خلال تحويل الجلايكوجين المخزن في خلايا الكبد.

تستخدم الخلايا الجلوكوز كأهم مصادر الطاقة حيث يدخل في العمليات الأيضية لاستخلاص الطاقة التي يستفيد منها الجسم في استمرار العمليات الحيوية.

يرتفع مستوى الجلوكوز في الدم عند تناول وجبات غذائية عالية في محتوى السكر، وينخفض كذلك عند انقطاع عن الغذاء لفترات طويلة مما يؤثر على حالة الجسم الفسيولوجية الحيوية، لذا يملك الجسم معدل طبيعي للجلوكوز في الدم يحافظ عليه، ويبلغ المعدل الطبيعي للجلوكوز في الدم حوالي ١١٠-٧٠ ملغم لكل ديسيل لি�تير في حالة الصيام أو الجوع.

يتم التحكم في ثبات المعدل الطبيعي للجلوكوز في الدم بواسطة نظام هرموني يشمل على هرمون الأنسولين الذي يفرز عند زيادة مستوى الجلوكوز في الدم، وكذلك هرمون الجلوكاجون الذي يفرز عند انخفاض مستوى الجلوكوز في الدم.

في مرض السكري (Diabetes mellitus) يكون هناك ارتفاع عالي في مستوى الجلوكوز في الدم وذلك نتيجة خلل في استفادة الخلايا من الجلوكوز.


قياس مستوى الجلوكوز في الدم:

يمكن قياس مستوى الجلوكوز في الدم باستخدام الطرق الأنزيمية Enzymatic methods

أو الطرق الكيميائية Chemical methods .

أ- الطرق الأنزيمية :

تعتبر الطرق الأنزيمية من أدق الطرق لتقدير الجلوكوز وذلك لتخصص الأنزيمات على المواد التي تعمل عليها والتفاعلات التي تحفظها وتعطي نتائج دقيقة جداً وتعتمد على أكسدة الجلوكوز بواسطة أنزيم جلوكوز أو كسيديز glucose oxidase إلى حمض الجلوكونيك gluconic acid بالإضافة إلى فوق أكسيد الهيدروجين H_2O_2 hydrogen peroxide ، ويعمل فوق أكسيد الهيدروجين الناتج على أكسدة المركب o-dianisidine في وجود إنزيم البيروكسيديز peroxidase إلى مركب ملون يمكن قياس الامتصاص الضوئي له عند طول موجي 540nm.



- تبرد الانابيب تحت الماء ، ثم يقاس الامتصاص عند ٦٣٠ نانوميتر .

النتائج :

مناقشة النتائج:

١٠. تقدير فيتامين ج (حمض الاسكوربيك) في العصير

الفيتامينات هي مركبات عضوية حيوية يحتاجها الجسم بكميات ضئيلة لأداء وظائف حيوية هامة للجسم . وهي من المركبات التي لا تصنع في جسم الإنسان ولكن يحصل عليها من الأغذية النباتية.

تلعب الفيتامينات دوراً كبيراً كعوامل مساعدة للإنزيمات coenzymes تعمل على تحفيز وتنشيط عمل الإنزيمات ، وكذلك قد توجد كجزء في التركيب الكيميائي للإنزيمات ، ولذلك نقصها يؤدي إلى اختلال في بعض الوظائف الحيوية للجسم.

أعطيت الفيتامينات رموزاً حرفية لدالة عليها مثل (A,B,C) وذلك قبل التعرف على تركيبها الكيميائي ، ولا تزال هذه الرموز مستخدمة لسهولتها.

تصنف الفيتامينات حسب ذوبايتها إلى قسمين هما:

١. الفيتامينات الذائبة في الماء water-soluble vitamin

وتشمل على مجموعة فيتامينات B وفيتامين C

٢. الفيتامينات الذائبة في الدهون fat--soluble vitamin

وتشمل على فيتامين (A,D,E,K)

فيتامين ج (Ascorbic acid)

أحد الفيتامينات الذائبة في الماء ، و يتواجد هذا الفيتامين بشكل اساسي في الحمضيات مثل البرتقال والليمون .

يساعد هذا الفيتامين على امتصاص الحديد من الامعاء وكذلك يساعد على تجديد الانسجة بحيث يعمل على تنشيط تكوين بروتين الكولاجين Collagen الذي يحمي الانسجة من التهتك والتلف وخاصة انسجة اللثة.

يؤدي نقص هذا الفيتامين إلى ظهور اعراض مرض الاسقربوط scurvey ويتميز هذا المرض بعدم اكمال بناء بروتين الكولاجين في الانسجة ، لذلك تظهر اعراضه بنزف اللثة وتورمها وتخلخل الاسنان وآلام في المفاصل .

ويتم التخلص من فيتامين ج عندما يؤخذ بكميات كبيرة عن طريق طرحة في البول.

*الاحتياجات اليومية من فيتامين ج في الغذاء بالملجرمات لكل يوم mg/day

٣٥	الاطفال تحت عمر السنة
٤٠	الاطفال من سنة الى ١٠ سنوات
٤٥	البالغين
٦٠	النساء الحوامل
٨٠	النساء المرضعات

فكرة الاختبار:

يعتبر فيتامين ج عامل مخترل ،لذلك يعتمد على مبدأ تقديره اختزال الصبغة ثنائي كلورو فينول اندو فينول (DCPIP) ذات اللون القرمزي في الحالة الاختزالية، وعديمة اللون في الحالة التأكسدية.

المواد والأدوات المطلوبة:

- صبغة ثنائي كلورو فينول اندو فينول DCPIP
 - تحضر باذابة ٠٦ ج من الصبغة ٢ لیتر من الماء المقطر
 - محلول فيتامين ج القياسي 0.04mg/ml standard vitamin C solution
 - يحضر باذابة ٤٠ ملغم من فيتامين ج في ١ لیتر من ٥ % حمض الخلية .
 - عصير البرتقال Orange Juice
 - قم بعصير البرتقالة واجمع العصير ثم قدر حجمه، ثم خفف ٥ مل من العصير الى ١٠٠ مل من حمض الخل 5% Acetic acid في دورق مخروطي
 - سحاحة Burette
 - دورق عياري Flask
-
- طريقة العمل:**
1. ضع 5mL من الصبغة DCPIP في دورق عياري
 2. عاير باستخدام فيتامين ج القياسي الى ان تحصل على محلول عديم اللون ،ثم احسب حجم المعايرة.
 3. عاير مرة اخرى ولكن باستخدام محلول عصير البرتقال المخفف ،ثم احسب حجم المعايرة.

النتائج:

- حجم عصير البرتقال = مل
- حجم معايرة فيتامين ج القياسي = مل
- حجم معايرة عصير البرتقال المخفف = مل

*احسب كمية فيتامين ج في عصير البرتقال الاصل؟ واستنتج كم برتقالة يحتاجها الفرد لسد الاحتياج اليومي من فيتامين ج؟

مناقشة النتائج

١١ . المراجع

- Abousalah, K. and Alnaser, A., 1996, Principles of practical biochemistry.
- Farid Shokry Ataya, 2007, Practical Biochemistry. AlRoshd Publisher, Riyadh, Saudi Arabia.
- Milio, F. R. and Loffredo, W. M., 1995, Qualitative Testing for Amino Acids and Proteins, modular laboratory program in chemistry, REAC 448.